別紙

愛玩鶏を含む家きん飼養者の皆様へ

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生リスクが高まっています！！

- ✧ ウイルスを一定量以下まで減らすことで感染を防ぐことができます。
- ✧ HPAI ウイルスと家きんを接触させないため以下の点を心掛けてください
  - ➢ 家きんを触る前には手洗いを実施
  - ➢ 飼育場所においては、糞尿は速やかに除去し毎日消毒し清潔を保つ
  - ➢ 鶏舎周辺においては、こまめな消毒の実施

HPAI に有効な消毒薬

手指、ケージ等の消毒	広い面積の散布消毒	地面などの消毒
市販のハンドスプレー 	蓄圧式噴霧器 	消石灰 塩素系消毒薬と混入すると効果を打ち消すので併用しないこと。 散布時には手袋、マスク、ゴーグル着用のこと。 
✓ エタノール、逆性石けん（塩化ベンザルコニウム（オスバンなど））、塩素系消毒薬等（次亜塩素酸ナトリウム(ハイターなど))、多くの消毒薬が HPAI ウイルスに有効です。 ✓ 市販の消毒薬は記載通りに水で希釈し用います。 ✓ 汚れがあると消毒効果が薄まるので汚れを落としてから消毒します。		

いずれもホームセンターなどで購入可能です

養鶏農家で行われている消石灰散布「待ち受け消毒」

衛生管理区域と鶏舎の周辺に 0.5～1 kg／1 ㎡の濃度で 1 m幅の散布



- ✓ 消石灰帯を通過したものに付着したウイルスを不活化
- ✓ 消石灰帯に落下したウイルスを不活化
- ✓ 野生動物の忌避効果
- ✓ 雪上の散布でも効果を発揮

※ 雨に濡れて乾くと消毒効果がなくなるので撒きなおす必要があります。

＜参考：家きんとは？＞

鶏（烏骨鶏も鶏です）
あひる（マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む）
うずら(ヨーロッパウズラを含む)
七面鳥
きじ(ヤマドリを含む)
だちょう
エミュー
ほろほろ鳥

滋賀県