



薬食監麻発0727第1号

平成24年7月27日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長



薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして  
厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について

今般、医薬品が新たに承認されることに伴い、平成24年厚生労働省告示第458号により、薬事法（昭和35年法律第145号。以下「法」という。）第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして新たな医薬品の指定をするため、法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭和38年厚生省告示第279号。以下「検定告示」という。）を別添のとおり一部改正したので、下記の改正要旨等について御了知の上、貴管下関係業者等に対する周知徹底及び指導に遺漏なきを期されたい。

なお、国立感染症研究所長、国立医薬品食品衛生研究所長、各地方厚生局健康福祉部長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製薬団体連合会会長、一般社団法人日本ワクチン産業協会理事長及び一般社団法人日本血液製剤協会理事長あてに当該通知の写しを送付したことを申し添える。


記

## 1 改正要旨

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンが承認されたことに伴い、当該医薬品を法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして指定し、その手数料、試験品の数量及び検定基準を定めたこと。

## 2 適用時期

公布日（平成24年7月27日）




### 3 標準処理期間

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンの検定に係る行政手続法（平成5年法律第88号）第6条の規定による標準処理期間（以下単に「標準処理期間」という。）は、以下のとおりとすること。

- ① 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液（中間段階） 40日
- ② 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液（中間段階） 60日
- ③ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチンに使用するポリオウイルス3価混合原液（中間段階） 110日
- ④ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン（最終段階） 130日

なお、現在、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして指定されている医薬品に係る標準処理期間は別紙のとおりであるので、参考にされたい。



3.2.4.3 エントトキシジ試験  
最終のバルクと等濃度以上としたものを試料とする。検体を希釈する場合は、エントトキシジ試験用水を用いる。  
日本薬局方一般試験法のエントトキシジ試験法を準用して試験するとき、0.4EU/mL以下でなければならぬ。

3.2.4.4 比抗原量試験 (たん白質含量、D抗原量)  
酵素免疫測定法等の適当な免疫学的方法によりD抗原量を測定する。一般試験法のたん白質定量法を準用して試験するとき、たん白質含量はD抗原量1 Du当たり0.1 $\mu$ g以下でなければならぬ。

3.3 小分製品の試験  
3.3.1 pH試験  
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき、承認された判定基準に適合しなければならぬ。

3.3.2 アルミニウム含量試験  
一般試験法のアルミニウム定量法を準用して試験するとき、1mL中0.3mg以下でなければならぬ。

3.3.3 ホルムアルデヒド含量試験  
一般試験法のホルムアルデヒド定量法を準用して試験するとき、0.01w/v%以下でなければならぬ。

3.3.4 無菌試験  
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならぬ。

3.3.5 異常毒性否定試験  
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならぬ。

3.3.6 エントトキシジ試験  
一般試験法のエントトキシジ試験法を準用して試験するとき、4.0EU/mL以下でなければならぬ。

3.3.7 ワウスヒスタミン増感試験  
沈降精製百日せきワクチン3.2.10を準用する。ただし、ワウスヒスタミン増感活性は0.8HSU/mL以下でなければならぬ。

3.3.8 シフテリア毒素無毒化試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.10を準用する。  
3.3.9 破傷風毒素無毒化試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.11を準用する。  
3.3.10 力価試験  
3.3.10.1 沈降精製百日せきワクチンの力価試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.12.1を準用する。  
3.3.10.2 沈降シフテリアトキシノイドの力価試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.12.2を準用する。  
3.3.10.3 沈降破傷風トキシノイドの力価試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.12.3を準用する。

3.3.10.4 不活化ポリオウイルスの力価試験  
ラットを免疫し、得られた血清中の中和抗体価を型別に測定する。  
3.3.10.4.1 材料  
検体、参照不活化ポリオワクチン(セービン株)及び攻撃用ウイルスを用いる。  
また、ポリオウイルスに感受性を有する細胞を指標細胞とし、これを適当な培地で希釈したものを細胞浮遊液とする。  
攻撃用ウイルスを適当な培地で希釈し、これを攻撃用ウイルス浮遊液とする。


3.3.10.4.2 試験  
検体及び参照品をそれぞれ希釈し、対数的等間隔の希釈を作る。  
8週齢のラット10匹以上を1群とし、各希釈に1群ずつを用いる。1匹当たり0.5mLを筋肉内に注射する。注射の20~22日後に、個体別に全ての動物から採血する。各群の個体別血清を適当な培地で希釈し、希釈血清と攻撃用ウイルス浮遊液の等量を混合する。その後、36 $\pm$ 1 $^{\circ}$ Cで3時間置いた後、5 $\pm$ 3 $^{\circ}$ Cで一夜置く。細胞浮遊液を添加し、36 $\pm$ 10 $^{\circ}$ Cで7日間培養する。培養終了後、細胞変性の有無を観察し、50%中和点の血清希釈倍数を算出し、その逆数を中和抗体価とする。

攻撃用ウイルス浮遊液の感染価を測定するとき、その値は32~320 C I D<sub>50</sub> 0.05mLでなければならぬ。  
3.3.10.4.3 判定  
試験の成績を統計学的に処理して比較するとき、承認された判定基準の下限値以上でなければならぬ。

3.3.11 表示確認試験  
沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン3.2.13を準用する。なお、不活化ポリオウイルスについては、血清学的方法により行う。  
4 貯法及び有効期間  
有効期間は、承認時に定められた期間とする。  
1 製造廠及び検査 製造廠 参照品 製造廠及び検査  
製造廠 参照品 製造廠及び検査  
参照不活化ポリオワクチン(セービン株)  
本剤は、特定の株の不活化ポリオウイルスI型、II型及びIII型をそれぞれ特定の濃度を含む液剤である。

○画井共製薬株式会社に譲渡  
昭和二十七年七月二十七日  
薬事法(昭和二十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項、薬事法施行令(昭和二十六年政令第百一十号)第五十八条及び第六十条並びに薬事法施行規則(昭和二十六年厚生省令第一号)第九十九條第一項の規定に基づき、薬事法第四十三條第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の認定を蒙る製薬品等(昭和二十八年厚生省令第百二十九号)の二部を次のように改正する。  
平成二十四年七月二十七日  
厚生労働大臣 小宮山 様  
一、注射薬の製造廠は、薬井共製薬株式会社に譲渡され、その製造廠は、薬井共製薬株式会社に譲渡されるものとする。

沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン	中間段階	沈降精製百日せきワクチン破傷風混合ワクチン(セービン株)混合ワクチン	小分製品と同濃度に希釈したシフテリアトキシノイド原液につき 内容量が20mLのもの2本
128,300円			



沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(中間段階)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(中間段階)の条の3.1.3及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチンの条の3.2.4(3.2.4.2, 3.2.4.3及び3.2.4.4を除く。)に規定する試験法によるものとする。ただし、生物学的製剤基準のジフテリアポリオの条の3.1.3(3.1.3.1を除く。)及び破傷風トキソイドの条の3.1.3に規定する試験法による場合の試験法は、最終ワクチンと同程度となるようにして37℃に20日間おいたものとする。	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(最終段階)生物学的製剤基準の沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチンの条の3.3.3, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9及び3.3.10に規定する試験法によるものとする。
最終段階	4,507,800円	内容量が0.5mLであるとき、176本
	763,500円	内容量が80mLのもの2本、小分製品の10倍濃度に希釈したポリオワクチン3価混合原液につき、内容量が80mLのもの2本、小分製品の10倍濃度に希釈したポリオワクチン3価混合原液につき、内容量が40mLのもの2本
	117,800円	小分製品と同濃度に希釈した破傷風トキソイド原液につき

この生物学的製剤の項は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(最終段階)の目の次に次(三)田を加える。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(中間段階)生物学的製剤基準のジフテリアポリオの条の3.1.3(3.1.3.1を除く。)、破傷風トキソイドの条の3.2.4(3.2.4.2, 3.2.4.3及び3.2.4.4を除く。)に規定する試験法によるものとする。ただし、生物学的製剤基準のジフテリアポリオの条の3.1.3(3.1.3.1を除く。)及び破傷風トキソイドの条の3.1.3に規定する試験法による場合の試験法は、最終ワクチンと同程度となるようにして37℃に20日間おいたものとする。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(最終段階)生物学的製剤基準の沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチンの条の3.3.3, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9及び3.3.10に規定する試験法によるものとする。

○厚生労働省告示第百四十九号  
 薬事法(昭和二十五年法律第百四十五号)第二条第九項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省令第百九十九号)の一部を次のように改正する。

平成二十四年七月二十七日 厚生労働大臣 小宮山洋子

- 別表第一の一(18)から(14)までを(14)から(18)までとし、(13)を(4)とし、その次に次のように加える。
- (141) パクリタキセル(人血清アルブミンを含有するものに限る。)
- 別表第一の一(18)から(11)までを(11)の次に次のように加える。
- (118) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン  
 別表第一の一(4)中(1)を(2)とし、その次に次のように加える。
- (1) 自家教育生細胞

○農林水産省告示第千八百四十九号  
 農薬取締法(昭和二十三年法律第百八十二号)第二条第一項の規定により、平成二十四年四月六日付けをもちつて次の農薬を登録し、同法第六条の七の規定による公告とする。

平成二十四年七月二十七日

登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所  
 23066 インダジラム水和剤 スベクタクルフロアール 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号  
 ハイエルクロックアイエンス株式会社  
 代表取締役 キヤベリンマシュー・チャヤント

○農林水産省告示第千八百五十五号  
 農薬取締法(昭和二十三年法律第百八十二号)第二条第一項の規定により、平成二十四年四月十日付けをもちつて次の農薬を登録し、同法第六条の七の規定による公告とする。

平成二十四年七月二十七日

登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所  
 23067 カニコナゾールP複合剤 スマツシユA14 東京都中央区新川二丁目27番1号  
 エコラフロ株式会社 社長 貫和之

○農林水産省告示第千八百五十一号  
 農薬取締法(昭和二十三年法律第百八十二号)第二条第一項の規定により、平成二十四年四月十一日付けをもちつて次の農薬を登録し、同法第六条の七の規定による公告とする。

平成二十四年七月二十七日

登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所  
 23069 ホーペリア バンナー ボタニガード水和剤 東京都中央区明石町8番1号  
 アリスタライフサイエンス株式会社 代表取締役  
 梨川トオル・ラフマンハナツ

23070 ペンテメタリオンイ ケイアアツアアアア クロカチセル剤 ウエイクアアアアア 東京都港区六本木六丁目10番1号  
 S F シヤハン株式会社 代表取締役社長  
 成尾友良

23071 トルクロホスチナル・ フラメトヒル水和剤 ダブルイーグル 東京都中央区八丁堀四丁目5番4号  
 野口 住


23072 眼着剤 アイヤーユーエス 東京都港区赤坂四丁目2番19号  
 アグロ 株式会社 代表取締役  
 引博

○農林水産省告示第千八百五十二号  
 農薬取締法(昭和二十三年法律第百八十二号)第二条第一項の規定により、平成二十四年四月二十五日付けをもちつて次の農薬を登録し、同法第六条の七の規定による公告とする。

平成二十四年七月二十七日

登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所  
 23073 d-リモノ乳剤 オレンジパワー 東京都中央区東日本橋一丁目1番5号  
 株式会社 エス・ブイー・エス パイオ  
 テック 代表取締役社長 安田誠

23074 ジフテリアワクチン アトラクタン錠 東京都港区東新橋一丁目5番2号  
 三井 化学株式会社 代表取締役社長  
 金井健彦



## (別紙) 医薬品の検定に係る標準処理期間

製剤		標準処理期間 (日)
インフルエンザワクチン		60
インフルエンザHAワクチン		80
沈降インフルエンザワクチン (H5N1株)	中間段階	35
	最終段階	35
乳濁A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)		35
乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)		35
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		100
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
ガスエソウマ抗毒素 (ガスエソ抗毒素)		70
乾燥ガスエソウマ抗毒素 (乾燥ガスエソ抗毒素)		70
不活化狂犬病ワクチン		70
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン		80
コレラワクチン		60
乾燥ジフテリアウマ抗毒素 (乾燥ジフテリア抗毒素)		70
ジフテリアトキソイド		70
沈降ジフテリアトキソイド		70
成人用沈降ジフテリアトキソイド		70
ジフテリア破傷風混合トキソイド		70
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		70
水痘抗原		40
乾燥弱毒生水痘ワクチン		60
腸チフスパラチフス混合ワクチン		60
精製ツベルクリン (一般診断用)		80
痘そうワクチン (痘苗)	中間段階	60
	最終段階	60
乾燥痘そうワクチン (乾燥痘苗)	中間段階	60
	最終段階	60
組織培養痘そうワクチン	中間段階	60
	最終段階	60
乾燥細胞培養痘そうワクチン	中間段階	60
	最終段階	60

製剤	標準処理期間 (日)	
日本脳炎ワクチン	80	
乾燥日本脳炎ワクチン	80	
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	80	
肺炎球菌ワクチン	60	
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	60	
破傷風トキソイド	70	
沈降破傷風トキソイド	70	
乾燥はぶウマ抗毒素 (乾燥はぶ抗毒素)	70	
沈降はぶトキソイド	50	
沈降B型肝炎ワクチン	80	
沈降B型肝炎ワクチン (h u G K - 1 4 細胞由来)	80	
組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	80	
組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	80	
組換え沈降 p r e - S 2 抗原・HBs 抗原含有B型肝炎ワクチン (酵母由来)	80	
乾燥B C G 膀胱内用 (コンノート株)	80	
乾燥B C G 膀胱内用 (日本株)	80	
乾燥B C G ワクチン	80	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	80	
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)	80	
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	70	
百日せきワクチン	100	
沈降精製百日せきワクチン	100	
百日せきジフテリア混合ワクチン	中間段階	100
	最終段階	100
百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	中間段階	100
	最終段階	100
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)	40	

製剤		標準処理期間 (日)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)		60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン (最終段階)		130
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)		40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)		60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用するポリオウイルス3価混合原液 (中間段階)		110
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチン (最終段階)		130
乾燥弱毒生風しんワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン (破傷風トキソイド結合体)		60
発しんチフスワクチン		70
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 (乾燥ボツリヌス抗毒素)		70
経口生ポリオワクチン	中間段階	160
	最終段階	70
不活化ポリオワクチン (ソークワクチン)		70
乾燥弱毒生麻しんワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
乾燥まむしウマ抗毒素 (乾燥まむし抗毒素)		70
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン		70
ワイル病秋やみ混合ワクチン		70
加熱人血漿たん白		50

製剤	標準処理期間 (日)
人血清アルブミン	50
乾燥人フィブリノゲン	50
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	50
人免疫グロブリン	60
アルキル化人免疫グロブリン	60
乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	60
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	60
pH 4 処理酸性人免疫グロブリン	60
乾燥pH 4 処理人免疫グロブリン	60
乾燥プラスミン処理人免疫グロブリン	60
乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
抗HB s 人免疫グロブリン	60
乾燥抗HB s 人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗HB s 人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗HB s 人免疫グロブリン	60
抗D (R h o) 人免疫グロブリン	50
乾燥抗D (R h o) 人免疫グロブリン	50
抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	60
人ハプトグロビン	60

(備考) 再抜き取り、再試験に要する期間を含まない。