

(別 添)

正誤表

頁	番号	処方名	項目	誤	正
10	39	芎帰調血飲	効能・効果	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に關わらず使用でき	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に關わらず使用できる。
10	40	芎帰調血飲第一加減	効能・効果	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に關わらず使用でき	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に關わらず使用できる。
19	75	呉茱萸湯	効能・効果	体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するもの次の諸症	体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するもの次の諸症
25	100	四物湯	効能・効果	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの次の諸症	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの次の諸症
27	109	生姜瀉心湯	効能・効果	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うもの次の諸症	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うもの次の諸症
28	114	小青竜湯	効能・効果	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症

頁	番号	処方名	項目	誤	正
40	171	二陳湯	成分・分量	半夏5・7、茯苓3.5・5、陳皮3.5・4、生姜1・1.5(ヒネシヨウガを使用する場合2・3)、甘草	半夏5・7、茯苓3.5・5、陳皮3.5・4、生姜1・1.5(ヒネシヨウガを使用する場合2・3)、甘草1・2
43	187	茯苓飲	効能・効果	体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するもの次の	体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するもの次の諸症
46	202	麻子仁丸	成分・分量	麻子仁4・5、芍薬2、枳実2、厚朴2・2.5、大黃3.5・4、杏仁2・2.5(甘草1.5を加えても)	麻子仁4・5、芍薬2、枳実2、厚朴2・2.5、大黃3.5・4、杏仁2・2.5(甘草1.5を加えても可)
47	205	抑肝散	効能・効果	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症(神経過敏)、歯ざしり、更年期障害、血の道	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症(神経過敏)、歯ざしり、更年期障害、血の道症 ^註
47	206	抑肝散加陳皮半夏	効能・効果	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症 ^註 、歯ざ	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症 ^註 、歯ざしり
48	212	苓桂朮甘湯	効能・効果	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるもの次の	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるもの次の諸症