

(8)水浴場水質測定結果

ア 平成19年度測定結果

●開設前:5月中旬から5月下旬

水浴場名	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/L)			透明度(m)			油膜	pH		O-157	判定
	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
1 松の浦	<2	<2	<2	1.6	2	1.8	>1	>1	>1	なし	7.3	8.2	不検出	水質AA
2 近江舞子	<2	<2	<2	1.7	2	1.9	>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	不検出	水質AA
3 なぎさ	<2	3	<2	3	3.2	3.1	>1	>1	>1	なし	8.5	8.7	不検出	水質B
4 宮ヶ浜	<2	<2	<2	2.2	2.5	2.4	>1	>1	>1	なし	8.4	8.4	不検出	水質AA
5 新海浜	<2	9	4	2.7	3.3	3	>1	>1	>1	なし	8.4	9.1	不検出	水質A
6 松原	<2	30	9	2.5	3.8	3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.9	不検出	水質A
7 南浜	<2	<2	<2	2	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.3	8.6	不検出	水質AA
8 二本松	<2	<2	<2	2.1	2.6	2.4	>1	>1	>1	なし	8.8	9	不検出	水質AA
9 マキサニビーチ	<2	<2	<2	1.9	2.5	2.3	>1	>1	>1	なし	7.9	8.7	不検出	水質AA
10 萩の浜	<2	2	<2	2.4	3	2.9	>1	>1	>1	なし	8.5	9.1	不検出	水質AA

●開設中:7月下旬から8月上旬

水浴場名	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/L)			透明度(m)			油膜	pH		O-157	判定
	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
1 松の浦	<2	15	4	2.5	3.3	3.1	>1	>1	>1	なし	8.5	9.1	不検出	水質B
2 近江舞子	<2	11	2	2.8	3.1	3.0	>1	>1	>1	なし	8.8	9.2	不検出	水質A
3 なぎさ	<2	<2	<2	3.7	3.9	3.9	>1	>1	>1	なし	8.9	9.1	不検出	水質B
4 宮ヶ浜	<2	<2	<2	3.1	3.6	3.3	>1	>1	>1	なし	8.8	9.2	不検出	水質B
5 新海浜	<2	6	3	3.1	3.3	3.3	>1	>1	>1	なし	8.4	8.8	不検出	水質B
6 松原	<2	50	15	3.0	3.6	3.4	>1	>1	>1	なし	8.4	8.9	不検出	水質B
7 南浜	<2	3	2	2.5	3.3	2.9	>1	>1	>1	なし	8.2	9.2	不検出	水質A
8 二本松	<2	<2	<2	2.8	3.1	2.9	>1	>1	>1	なし	8.9	9.2	不検出	水質AA
9 マキサニビーチ	<2	5	2	2.6	3.3	3.0	>1	>1	>1	なし	8	9	不検出	水質A
10 萩の浜	<2	3	<2	2.5	3.1	2.9	>1	>1	>1	なし	8.1	9.2	不検出	水質AA

■汀線500mごとに1地点調査(和逆浜、松の浦、近江舞子および松原は2地点を調査)

イ 平成20年度測定結果

●開設前：5月中旬から5月下旬

水浴場名	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/L)			透明度(m)			油膜	pH		O-157	判定
	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
1 松の浦	<2	3	<2	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	7.6	8.6	不検出	水質AA
2 近江舞子	<2	<2	<2	1.9	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.6	不検出	水質AA
3 なぎさ	<2	64	31	2.9	3.8	3.5	0.7	>1	0.9	なし	7.7	8.9	不検出	水質B
4 宮ヶ浜	<2	<2	<2	2.4	2.7	2.6	>1	>1	>1	なし	8.4	8.6	不検出	水質AA
5 新海浜	<2	2	<2	2.3	2.8	2.6	>1	>1	>1	なし	8.6	9.2	不検出	水質AA
6 松原	<2	8	4	2.5	3.2	2.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.8	不検出	水質A
7 南浜	<2	3	<2	2.3	2.6	2.5	>1	>1	>1	なし	8.3	8.7	不検出	水質AA
8 二本松	<2	<2	<2	2.6	2.8	2.7	>1	>1	>1	なし	9	9.2	不検出	水質AA
9 マキサニビーチ	<2	2	<2	2.4	2.8	2.7	>1	>1	>1	なし	8.1	9	不検出	水質AA
10 萩の浜	<2	3	<2	2.7	3.3	3	>1	>1	>1	なし	8.7	9.5	不検出	水質AA

●開設中：7月下旬から8月上旬

水浴場名	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/L)			透明度(m)			油膜	pH		O-157	判定
	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
1 松の浦	<2	48	25	2.3	2.8	2.6	>1	>1	>1	なし	8.5	8.9	不検出	水質A
2 近江舞子	6	34	15	2.4	3.1	2.8	>1	>1	>1	なし	9	9.1	不検出	水質A
3 なぎさ	<2	11	5	3.1	3.4	3.3	>1	>1	>1	なし	7.8	8.9	不検出	水質B
4 宮ヶ浜	<2	38	17	2.9	3.7	3.3	>1	>1	>1	なし	9	9.2	不検出	水質B
5 新海浜	<2	7	2	2.7	3.7	3.5	>1	>1	>1	なし	8.7	9	不検出	水質B
6 松原	<2	10	2	2.9	4.1	3.4	>1	>1	>1	なし	9	9.2	不検出	水質B
7 南浜	<2	<2	<2	2.7	3.2	3	>1	>1	>1	なし	9.2	9.4	不検出	水質AA
8 二本松	<2	10	3	2.6	3.3	3	>1	>1	>1	なし	9.2	9.5	不検出	水質A
9 マキサニビーチ	<2	3	2	2.4	3	2.7	>1	>1	>1	なし	9	9.2	不検出	水質A
10 萩の浜	3	23	10	3.3	3.7	3.5	>1	>1	>1	なし	8.6	9.2	不検出	水質B

■汀線500mごとに1地点調査(和迹浜、松の浦、近江舞子および松原は2地点を調査)