

6 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率

(1) 肥満傾向児の出現率

滋賀県における肥満傾向児の出現率を年齢別にみると、男子では、15歳が11.62%と最も高く、10%を超えています。女子では、10歳が7.52%と最も高くなっています。

これを全国平均値と比べると、男子、女子ともにいずれの年齢でも全国平均値より肥満傾向児の出現率が低くなっています。

また、都道府県別にみると、男子の8歳が全国第43位になっています。

(表9)

(2) 痩身傾向児の出現率

痩身傾向児の出現率を年齢別にみると、男子では、15歳の3.32%が最も高く、女子では、13歳の5.61%が最も高くなっています。

これを全国平均値と比べると、男子では8歳、11歳、14歳、16歳、17歳以外の年齢、女子では6歳、7歳、11歳、12歳、17歳以外の年齢で全国平均値より痩身傾向児の出現率が高くなっています。

また、都道府県別にみると、男子で13歳が全国第1位、女子で13歳、16歳が全国第1位、14歳が全国第3位になっています。

(表9)

表9 滋賀県と全国の年齢別・男女別肥満傾向児および痩身傾向児の出現率の比較 (単位:%)

性別	学校種別	学年	年齢	肥満傾向児			痩身傾向児		
				滋賀県(A)	全国(B)	差(A-B)	滋賀県(C)	全国(D)	差(C-D)
男子	幼稚園		5歳	1.33	2.14	△ 0.81	-	0.33	△ 0.33
	小学校	1年生	6歳	3.71	3.75	△ 0.04	0.66	0.40	0.26
		2年生	7歳	4.43	5.18	△ 0.75	0.95	0.54	0.41
		3年生	8歳	4.21	6.70	△ 2.49	0.83	1.17	△ 0.34
		4年生	9歳	7.06	8.39	△ 1.33	1.64	1.50	0.14
		5年生	10歳	7.13	9.42	△ 2.29	3.27	2.69	0.58
		6年生	11歳	9.39	9.46	△ 0.07	2.39	3.05	△ 0.66
	中学校	1年生	12歳	9.58	10.25	△ 0.67	3.09	2.43	0.66
		2年生	13歳	6.42	9.02	△ 2.60	2.74	1.55	1.19
		3年生	14歳	7.42	8.48	△ 1.06	1.57	1.73	△ 0.16
	高等学校	1年生	15歳	11.62	11.99	△ 0.37	3.32	2.60	0.72
		2年生	16歳	8.21	11.16	△ 2.95	0.72	1.82	△ 1.10
		3年生	17歳	9.22	11.54	△ 2.32	1.11	1.54	△ 0.43
	女子	幼稚園		5歳	2.23	2.40	△ 0.17	0.63	0.40
小学校		1年生	6歳	3.72	3.93	△ 0.21	0.43	0.65	△ 0.22
		2年生	7歳	3.99	4.86	△ 0.87	0.18	0.55	△ 0.37
		3年生	8歳	3.99	5.94	△ 1.95	1.14	1.03	0.11
		4年生	9歳	6.31	6.82	△ 0.51	2.19	1.96	0.23
		5年生	10歳	7.52	7.71	△ 0.19	3.04	2.64	0.40
		6年生	11歳	5.35	8.12	△ 2.77	2.89	2.98	△ 0.09
中学校		1年生	12歳	7.00	8.51	△ 1.51	3.63	4.32	△ 0.69
		2年生	13歳	5.57	7.49	△ 1.92	5.61	3.91	1.70
		3年生	14歳	5.93	7.43	△ 1.50	3.33	2.61	0.72
高等学校		1年生	15歳	5.93	8.26	△ 2.33	3.87	2.65	1.22
		2年生	16歳	5.79	7.33	△ 1.54	4.03	2.22	1.81
		3年生	17歳	5.40	7.76	△ 2.36	0.28	1.89	△ 1.61

(注)「-」は、該当者がいません。

肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者です。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が△20%以下の者です。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100(%)