

## 10月の栽培管理について

令和3年10月7日大阪管区気象台発表「近畿地方1か月予報」（10月9日から11月8日までの天候見通し）では、向こう1か月の平均気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。とのコメントでした。また、定期的に降雨があり低温で湿度の高い環境が発生しております。

この気象条件であれば下記の病気の発生が心配されます。

また、生育量を確保ししっかりと生育させるために、土寄せ作業+適期追肥を行われるなか、追肥により窒素成分を多く施用することから**さび病**の発生にご注意ください。

なお、現地巡回では、黒斑病・アザミウマ類・ハモグリバエ・ヨトウムシ類の発生も確認しておりますので各圃場の発生状況についてご確認ください。

### <注意する主な病害虫>

病気：さび病、葉枯病、黒斑病、べと病、疫病、軟腐病、白絹病

虫：アザミウマ類、ハモグリバエ類、ヨトウムシ類

### <今月の防除例>

① アミスター20フロアブル（さび病、葉枯病、黒斑病）

② バリダシン液剤5（軟腐病、白絹病等）

③ ベネビアOD（ヨトウムシ類、ハモグリバエ類等）※発生状況に応じて

④カナメフロアブル（さび病、白絹病）

\*防除の内容についてはJA等へお聞きください。

\*新しくグレーシア乳剤が「アザミウマ類」で登録されました。使用される場合は、JA等にご相談ください。

<主な農薬一覧>

対象病名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
疫病	アリエッティ水和剤	収穫3日前まで	800倍	3回以内	殺菌(治療)

対象病名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
べと病	アリエッティ水和剤	収穫3日前まで	800倍	3回以内	殺菌(治療)
べと病	アミスター-20フロアブル	収穫3日前まで	2000倍	4回以内	殺菌(治療)
べと病 注1	プロポーズ顆粒水和剤	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
べと病 注1	レーバスフロアブル	収穫7日前まで	2000倍	2回以内	殺菌(治療)
べと病 注1	リドミルゴールドMZ	収穫30日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)

対象病名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
軟腐病	オリゼメート粒剤	土寄せ時 収穫30日前まで	6kg/10a	2回以内	殺菌(予防)
軟腐病	ヨネボン水和剤	収穫7日前まで	500倍	4回以内	殺菌(予防)
軟腐病	カスミンボルドー	収穫14日前まで	1000倍	2回以内	殺菌(治療)
軟腐病	スターナ水和剤	収穫7日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
軟腐病	バリダシン液剤5	収穫21日前まで	500倍	1回	殺菌(治療)

対象病名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
白絹病	モンガリット粒剤	土寄せ時 但し、収穫14日前まで	4~6kg/10a	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	モンカット粒剤	土寄せ時 但し、収穫30日前まで	4~6kg/10a	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	モンカットフロアブル40	土寄せ時 但し、収穫30日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	ロブラール水和剤	収穫14日前まで	500~1000倍	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	リゾレックス水和剤	土寄せ時 但し、収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	リゾレックス粉剤	土寄せ前 但し、収穫14日前まで	20~30kg/10a	3回以内	殺菌(治療)
白絹病	フロンサイド粉剤	土寄せ時但し収穫21日前まで	15kg/10a	2回以内	殺菌(予防)
白絹病	アフエットフロアブル	生育期 但し、収穫14日前まで	1000~2000倍	2回以内	殺菌(治療)

適用病害虫雑草名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
さび病	ヨネボン水和剤	収穫7日前まで	500倍	4回以内	殺菌(予防)
さび病	ダコニール1000	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(予防)
さび病	ジマンダイセン水和剤	収穫14日前まで	600倍	3回以内	殺菌(予防)
さび病	ラリー水和剤	収穫7日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
さび病	ベルコート水和剤	収穫30日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
さび病	アミスター-20フロアブル	収穫3日前まで	2000倍	4回以内	殺菌(治療)
さび病	アミスターオプティフロア	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
さび病	アフエットフロアブル	収穫前日まで	2000倍	2回以内	殺菌(治療)

適用病害虫雑草名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
黒斑病	ジマンダイセン水和剤	収穫14日前まで	600倍	3回以内	殺菌(予防)
黒斑病	ポリオキシンAL水和剤	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	ロブラール水和剤	収穫14日前まで	1000~1500倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	ポリペリン水和剤	収穫14日前まで	1500倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	ベルコート水和剤	収穫30日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	アミスター-20フロアブル	収穫3日前まで	2000倍	4回以内	殺菌(治療)
黒斑病	オンリーワンフロアブル	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	テーク水和剤	収穫14日前まで	600倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	ドーシャスフロアブル	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	ストロビーフロアブル	収穫7日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	アミスターオプティフロア	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
黒斑病	アフエットフロアブル	収穫前日まで	2000倍	2回以内	殺菌(治療)

対象病名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
葉枯病	ダコニール1000	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(予防)
葉枯病	ポリペリン水和剤	収穫14日前まで	1500倍	3回以内	殺菌(治療)
葉枯病	ベルコート水和剤	収穫30日前まで	2000倍	3回以内	殺菌(治療)
葉枯病	アミスター-20フロアブル	収穫3日前まで	2000倍	4回以内	殺菌(治療)
葉枯病	テーク水和剤	収穫14日前まで	600倍	3回以内	殺菌(治療)
葉枯病	プロポーズ顆粒水和剤	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)
葉枯病	アミスターオプティフロア	収穫14日前まで	1000倍	3回以内	殺菌(治療)

適用病害虫雑草名	農薬の名称	使用時期	希釈倍数使用量	本剤の使用回数	効果
アザミウマ類	モスピラン水溶剤	収穫7日前まで	2000倍	3回以内	殺虫
アザミウマ類 注5	スタークル顆粒水溶剤	収穫3日前まで	2000倍	2回以内	殺虫
アザミウマ類 注5	ベネビアOD	収穫前日まで	2000倍	3回以内	殺虫

ベネビアOD						
作物名	適用病虫害 雑草名	希釈倍数使 用量	散布液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日ま で	3回以内	散布
ねぎ	シロイチモジ ヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日ま で	3回以内	散布
ねぎ	ハモグリバエ 類	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日ま で	3回以内	散布

注1:他の野菜で疫病の登録があるもの

農業登録:平成30年 8月 23日現在

注2:農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器のラベルに従ってください。

注3:高温時の散布は薬害が危惧されるため避けてください。

注4:発病の状況に応じて、農薬は変更してください。

注5:ハモグリバエ類の登録あり。