

Ⅲ. 防除薬剤一覧表

1. 水稻

(1) 種子消毒

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|----|----|-----|---------------------|-----|----|-----------------------|--|---|---|
| スターナ水和剤 | オキリニック酸水和剤 | もみ枯細菌病 | 200倍 | 浸種後 | 1回 | 5時間種子浸漬 | | 普 | I | | | | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前 | | 5～24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 400～800倍 | 浸種後 | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 400倍 | 浸種前 | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍 | | | 48～72時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種子重量の0.3～0.5% | | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | 褐条病 | 200倍 | 浸種後 | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前 | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種子重量の0.5% | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | | | | |
| | | | 200倍 | | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | |
| 苗立枯細菌病 | 200倍 | 浸種後 | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | | | | | | | |
| | 20倍 | 浸種前 | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5倍 | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | | |
| | 乾燥種子重量の0.5% | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | | | | | | | |
| | 200倍 | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20倍 | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | | |
| スターナSE | オキリニック酸・フクロロス水和剤 | いもち病 | 200倍 | 浸種前 | 1回 | 24時間浸漬 | | 普 | I | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | 200倍 | | | 24時間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | ばか苗病 | 200倍 | | | 24時間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 200倍 | | | 24時間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | 褐条病 | 200倍 | | | 24時間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 200倍 | | | 24時間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 20倍 | | | 10分間浸漬 | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(乾燥種籾1kg当り希釈液30mL) | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | |
| | | スターナ乳剤 | フクロロス乳剤 | | | いもち病 | | | | 1000倍 | 浸種前 | 1回 | 24時間種子浸漬 | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | 100倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | |
| | | | | | | | | | | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | |
| | | | | | | ごま葉枯病 | | | | 1000倍 | | | 24時間種子浸漬 | | | |
| | | | | | | | | | | 100倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | |
| | | | | | | | | | | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | |
| ばか苗病 | 1000倍 | | | 24時間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | |
| | 100倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | | | | |
| | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|----|----|-----|----------|
| テカリド C707 フル | イソコナー ル・銅水和 剤 | いもち病 | 200倍 | 浸種前 | 1回 | 24時間種子浸漬 | | 普 | I | |
| | | | 20倍 | | | 10分間種子浸漬 | | | | |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | ほか苗病 | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌 病 | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | 褐条病 | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | 苗立枯細菌 病 | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | 苗立枯病(ト リコテル菌) | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| | | | 20倍 | | | | | | | 10分間種子浸漬 |
| | | | 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | | | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | |
| | | | 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | | | 種子塗沫処理 | | | | |
| | | 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | |
| | | 苗立枯病(リ ゾーナス菌) | 200倍 | | | | | | | 24時間種子浸漬 |
| 20倍 | 10分間種子浸漬 | | | | | | | | | |
| 4倍、使用量は乾燥種粉 1kg当り希釈液20mL | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は種 子塗沫処理 | | | | | | | | | |
| 7.5倍、使用量は乾燥種 粉1kg当り希釈液30mL | 種子塗沫処理 | | | | | | | | | |
| 原液、使用量は乾燥種粉 1kg当り原液5mL | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|---------------------------|------|---------|--|----|----|-----|---|------------|-----|----|---|--|---|---|
| トリフィン水和剤 | トリフィン水和剤 | いもち病 | 300倍 | 浸種前 | 1回 | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用) 種子粉衣(湿粉衣) | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | | 7.5～15倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | 300倍 | | | | | | | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用) 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5～15倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ばか苗病 | 300倍 | | | | | | | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用) 種子粉衣(湿粉衣) | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5～15倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 300倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| トリフィン乳剤 | トリフィン乳剤 | いもち病 | 300倍 | 浸種前 | 1回 | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5～10倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | 300倍 | | | | | | | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5～10倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ばか苗病 | 300倍 | | | | | | | 24～48時間種子浸漬 10分間種子浸漬 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5～10倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 300倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5～10倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| モカートC水和剤 | 銅・フルコジニル・ベゾート水和剤 | いもち病 | 200倍 | 浸種前 | 1回 | 24時間種子浸漬 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ばか苗病 | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 褐条病 | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗立枯病(トリコチウム菌) | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗立枯病(フザリウム菌) | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗立枯病(リゾプス菌) | 200倍 | | | | | | | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 種子粉衣(湿粉衣) 24時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | | | 7.5倍(使用量は乾燥種1kg当り希釈液30mL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乾燥種重量の0.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | スミオン乳剤 | MEP乳剤 | | | | | | | イソキサレチンフェウ | 1000倍 | は種前 | 1回 | 6～72時間浸漬 専用の種子消毒機を用いて乾燥種重量の3%の量の希釈液を種粒に吹付け処理又は塗沫処理 | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | | 100倍 | | | | | | |
| | | パタンスG水溶剤 | カルタップ水溶剤 | | | | | | | イソキサレチンフェウ | 1500～3000倍 | 浸種前 | 1回 | 24時間種もみ浸漬 | | 劇 | I |
| | | エコフィット | 醸造酢液剤 | | | | | | | もみ枯細菌病 | 100倍 | 催芽時 | 1回 | 24時間種子浸漬 | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | 褐条病 | 100～200倍 | 催芽前 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 苗立枯細菌病 | 100倍 | 催芽時 | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------|---------------------------|----|----|-----|-----|
| エコーフ | トリコフ ルマアトピ リテ水和剤 | いもち病 | 200倍 | 催芽時 浸種前～催芽前 | - | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | - | - | |
| | | ごま葉枯病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | ばか苗病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | 苗立枯病(リゾプス菌) | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | いもち病 | 200倍 | 浸種前～催芽時 催芽時 | | 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | ばか苗病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24～48時間種子浸漬 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24～48時間種子浸漬 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | 褐条病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| エコーフ DJ | トリコフ ルマアトピ リテ水和剤 | いもち病 | 200倍 | 浸種前～催芽時 催芽時 | - | 24時間種子浸漬 | | - | - | |
| | | ばか苗病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24～48時間種子浸漬 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24～48時間種子浸漬 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | 褐条病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | | 催芽時 浸種前～催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | 苗立枯病(リゾプス菌) | | 催芽時 浸種前～催芽時 | | 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | いもち病 | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | ばか苗病 | 200倍 | 浸種前 催芽前 | | 1時間種子浸漬 湿粉衣 | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | 褐条病 | 200倍 | 浸種前～催芽前 | | 1時間種子浸漬 湿粉衣 | | | | |
| タワロック | カラマイセス フラバース水和剤 | いもち病 | 200倍 | 催芽時 催芽前 | - | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | - | - | |
| | | | 20倍 | 浸種前～催芽前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | ばか苗病 | 200倍 | 浸種前 種子重量の2～4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前～催芽前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 200倍 | 浸種前 種子重量の2～4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | もみ枯細菌病 | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前～催芽前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 200倍 | 浸種前 種子重量の2～4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | 褐条病 | 200倍 | 催芽時 | | 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | | 催芽前 | | 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前～催芽前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 200倍 | 浸種前 種子重量の2～4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | 苗立枯病(トリコフ ルマ菌) | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 200倍 | 浸種前 種子重量の4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | 苗立枯病(フザリウム菌) | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 20倍 | 浸種前 | | 1時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 200倍 | 浸種前 種子重量の4% | | 浸種前 | | | | 湿粉衣 |
| | | 苗立枯病(リゾプス菌) | 200倍 | 催芽時 催芽前 | | 24時間種子浸漬 24～48時間種子浸漬 | | | | |
| | 20倍 | 浸種前 | 1時間種子浸漬 | | | | | | | |
| | 200倍 | 浸種前 種子重量の4% | 浸種前 | 湿粉衣 | | | | | | |
| モミンーフ水和剤 | パチルス シンプレックス水和剤 | もみ枯細菌病 | 200倍 | 浸種前～催芽時 | - | 24時間種子浸漬 | | - | - | |
| | | | 乾燥種子重量の1% | 浸種前 | | 種子粉衣(湿粉衣) | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 200倍 | 浸種前～催芽時 | | 24時間種子浸漬 | | | | |
| | | | 乾燥種子重量の1% | 浸種前 | | 種子粉衣(湿粉衣) | | | | |
| ヨハルシートFS | テラニブロール水和剤 | イネツムシ | 乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで) | は種前(浸種後) | 1回 | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | 普 | I | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | イネトロイムシ | | は種前(浸種後) | | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | イネヒメハモグリハエ | | は種前(浸種後) | | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | は種前(浸種後) | | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | キリウシガカンホ | | は種前(浸種後) | | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | コブノメイガ | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | ツマグロヨコバイ | | は種前(浸種後) | | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | |
| ニカメイチュウ | | は種前(浸種前) | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | | | | |
| | | は種前(浸種後) | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | | | | |
| | | は種前(浸種前) | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | | | | |
| | | は種前(浸種後) | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | | | | | | |
| | | は種前(浸種前) | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | | | | |
| ルーチンシートFS | イソチアニル水和剤 | いもち病 | 乾燥種もみ1kg当り原液6～12mL(原液71mL/10aまで) | は種前(浸種後) | 1回 | コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理 | | 普 | I | |
| | | | | は種前(浸種前) | | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | | | |

(2) 育苗箱施薬

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通用）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通用）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|----------------------|--|--|--|--------------------|---|----|-----|
| ダニール1000 | TPN水和剤 | 苗立枯病(リゾーブス菌) | 1000~2000倍 500~1000倍 | は種時から緑化期 但し、は種14日後まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 普 | II |
| ダニール粉剤 | TPN粉剤 | 苗立枯病(リゾーブス菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り15~20g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和する。 | 普 | II |
| ダニール水和剤 | ベニール・TPN水和剤 | いもち病(苗いもち) 苗立枯病(トリコドマ菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾーブス菌) | 400倍 400~600倍 800~1200倍 400~600倍 800~1200倍 400~600倍 800~1200倍 | は種時 は種時から緑化期 但し、は種14日後まで | 1回 2回以内 | 灌注 | 普 | II |
| ダニールエースM液剤 | ヒドロキソキノキサール・メチルシロム液剤 | 苗立枯病(ヒシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 1000倍 500~1000倍 1000倍 500~1000倍 | は種時 は種時又は発芽後 は種時 は種時又は発芽後 | 1回 | 土壌灌注 | 普 | I |
| ダニールエースM粉剤 | ヒドロキソキノキサール・メチルシロム粉剤 | 苗立枯病(ヒシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り6~8g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和 | 普 | I |
| ダニール液剤 | ヒドロキソキノキサール液剤 | ごま葉枯病 苗立枯病(ヒシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 1000倍 500倍 1000倍 500~1000倍 1000倍 500~1000倍 | は種時 は種時及び発芽後 | 1回 2回以内 | 土壌灌注 | 普 | I |
| ダニールエースM液剤 | ヒドロキソキノキサール・メチルシロム液剤 | 苗立枯病(ヒシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾーブス菌) | 1000~2000倍 2000倍 1000倍 2000倍 1000倍 2000倍 | は種時から緑化期 は種時 | 2回以内 | 土壌灌注 | 普 | I |
| ダニールエースM粉剤 | ヒドロキソキノキサール・メチルシロム粉剤 | 苗立枯病(ヒシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾーブス菌) | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り6~8g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和する。 | 普 | I |
| ダニール液剤5 | バリダマイシン液剤 | 苗立枯病(リゾーブス菌) 苗立枯病(白絹病菌) | 1000倍 | は種時~発病初期 | 1回 | 灌注 | 普 | I |
| ベニール水和剤 | ベニール水和剤 | いもち病 苗立枯病(トリコドマ菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 1000倍 500~1000倍 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り1g 1000倍 500~1000倍 | は種時~は種7日後頃 は種前 は種時1回又はは種時とは種7日後頃の2回 は種時 | 2回以内 1回 2回以内 | 灌注 床土混和 灌注 | 普 | I |
| Dr. オレグ 箱粒剤 | フロベナゾール粒剤 | いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 緑化期~移植当日 移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| エコフィット | 醸造酢液剤 | もみ枯細菌病 | 100倍 10倍 | は種時 | 1回 | 灌注 散布 | 普 | I |
| エコブ | トリコドマ・フトロドリン水和剤 | ばか苗病 もみ枯細菌病 | 50倍 200倍 | は種時覆土前 | - | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り100mLを散布 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り500mLを散布 | - | - |
| カスミン粒剤 | カスガマイシン粒剤 | 褐条病 苗立枯細菌病 幼苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り15~20g 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り30g 育苗箱(30×60×3cm覆土約1%)覆土1%当り15~20g 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り15~20g 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り30g 育苗箱(30×60×3cm覆土約1%)覆土1%当り15~20g 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り15~20g 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り30g 育苗箱(30×60×3cm覆土約1%)覆土1%当り15~20g | 覆土前 は種前 覆土前 は種前 覆土前 は種前 覆土前 | 1回 | 育苗箱には種した種粒の上から均一に散布する。 育苗培土に均一に混和する。 覆土に均一に混和する。 育苗箱には種した種粒の上から均一に散布する。 育苗培土に均一に混和する。 覆土に均一に混和する。 育苗箱には種した種粒の上から均一に散布する。 育苗培土に均一に混和する。 | 普 | I |
| グレイット箱粒剤 | チアゾール粒剤 | いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 緑化期~移植当日 移植当日 緑化期~移植当日 | 1回 | 育苗箱中の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| シグムルキック箱粒剤 | トルブ・ロルブ 粒剤 | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------|---------------------|----|-----|------------|----|-----------------|---|---|------------|----|-----------------|---|---|
| アキラ箱粒剤 | チアトキム粒剤 | イネトオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | 移植前3日～移植当日 | 1回 | 育苗箱中の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ツマゲロコバエ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルパリン箱粒剤 | ジノフラン粒剤 | イネコカメシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | は種時覆土前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | イネトオイムシ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ツマゲロコバエ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植3日前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ粒剤 | イネシカメシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%) 1箱当り60g | 移植前3日～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イネモグリハエ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%) 1箱当り30～60g | | | | | | 移植前3日～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | |
| | | イネモグリハエ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%) 1箱当り50～80g | | | | | | | | | | | 移植前3日～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | ヒジロウカ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ツマゲロコバエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトビウカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スタール箱粒剤 | ジノフラン粒剤 | イネコカメシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | は種時覆土前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | イネトオイムシ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ツマゲロコバエ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | は種時覆土前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植3日前～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | フタオヒコヤガ | | 移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | |
| セロカウト粒剤 | スビノサト粒剤 | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | 移植2日前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| イネトオイムシ | は種時(覆土前)～移植当日 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イネモグリハエ | は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イネミスゾウムシ幼虫 | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | 移植2日前～移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタオヒコヤガ | は種時(覆土前)～移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--|-------------|---------|--|----|-----|-----------------------------------|-----------|----|--|---|---|
| ダントツ箱粒剤 | カチオン剤 | イネドカムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | イネドトイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | イネヒモグサリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ツマクドコバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | フタバコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | バダン粒剤4 | カルタップ粒剤 | イネノウムシ幼虫 | | | | | 育苗箱1箱当り80~100g | は種前又は移植当日 | 1回 | は種前に育苗箱床土に均一に混和するか、又は移植当日に育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。 | 劇 | I |
| | | | | イネドトイムシ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g | | | | | |
| イネヒモグサリハエ | 育苗箱1箱当り60~100g | | | | | | | | | | | | | |
| イネミスヅウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g | | | | | | | | | | | | | |
| コブノメイガ | 育苗箱1箱当り60~100g | | | | | | | | | | | | | |
| スクミリンゴガイ(食害防止) | 育苗箱1箱当り60~100g | | | | | | | | | | | | | |
| ツマクドコバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g | | | | | | | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | 育苗箱1箱当り80~100g | | | | | | | | | | | | | |
| ハリアート箱粒剤 | チアクロリド粒剤 | イネドトイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植前2日~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | | | | | | | | | | | |
| | | ツマクドコバエ | | | | | | | | | | | | |
| フェルテラ箱粒剤 | カレントラニワール粒剤 | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時覆土前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | | は種前 | | | | | | | | | | | |
| | | イネドトイムシ | は種時覆土前~移植当日 | | | | | | | | | | | |
| | | | は種前 | | | | | | | | | | | |
| | | イネヒモグサリハエ | 移植当日 | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | は種時覆土前~移植当日 | | | | | | | | | | | |
| | | | は種前 | | | | | | | | | | | |
| | | コブノメイガ | は種時覆土前~移植当日 | | | | | | | | | | | |
| | | | は種前 | | | | | | | | | | | |
| | | ツマクドコバエ | 移植当日 | | | | | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | は種時覆土前~移植当日 | | | | | | | | | | | | | |
| | は種前 | | | | | | | | | | | | | |
| | は種時覆土前~移植当日 | | | | | | | | | | | | | |
| | は種前 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------|--|----|-----|---|
| ヨハール箱粒剤 | テラリアール粒剤 | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50~75g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | |
| | | イネツトムシ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | イネトノカイ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | イネヒメコガリバエ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | イネミスヅウムシ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | コブノメイガ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | ツマゲロコバエ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | ニカメイチュウ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | フタオビコヤガ | | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| | | Cs.オビレイト7箱粒剤 | | フルビリン・フロベナゾール粒剤 | | | | | イネトノカイ イネミスヅウムシ いもち病 ウカ類 ツマゲロコバエ ニカメイチュウ |
| Dr.オビレイトスター箱粒剤 | シノテラン・フロベナゾール粒剤 | イネツカムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5%) 1箱当り50g | 緑化期~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I | |
| | | イネトノカイ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | いもち病 | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | ウカ類 | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | ツマゲロコバエ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | フタオビコヤガ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 緑化期~移植当日 | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | 移植3日前~移植当日 | | | | | | | | |
| Dr.オビレイト7箱粒剤 | シノテラン・フロベナゾール粒剤 | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I | |
| | | イネツトムシ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | イネトノカイ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | イネヒメコガリバエ | | 移植当日 | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | いもち病 | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | ツマゲロコバエ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | ヒトビウカ | | 緑化期~移植当日 | | | | | |
| | | フタオビコヤガ | | 移植3日前~移植当日 | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|---|--|--|--|------------|-------------------------------|--|----|-----|
| Dr. オレベ [®] フェルテラ [®] グレートム粒剤 | クロラントリニア [®] ロール・チルガ [®] ミト [®] ・フ [®] ロベ [®] ナ [®] ール粒剤 | イネト [®] オイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植3日前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネミス [®] ゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | ツマゲ [®] ロヨコバ [®] イ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | フタビ [®] コヤカ [®] | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | 紋枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | Dr. オレベ [®] フェルテラ [®] 粒剤 | クロラントリニア [®] ロール・フ [®] ロベ [®] ナ [®] ール粒剤 | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | |
| イネト [®] オイムシ | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | |
| イネヒカモク [®] リハ [®] エ | 緑化期～移植当日 | | | | | | | |
| イネミス [®] ゾウムシ | 移植当日 | | | | | | | |
| いもち病 | 緑化期～移植当日 | | | | | | | |
| コブ [®] メイガ [®] | 移植当日 | | | | | | | |
| ツマゲ [®] ロヨコバ [®] イ | 緑化期～移植当日 | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | | | | | | | | |
| フタビ [®] コヤカ [®] | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | |
| Dr. オレベ [®] リディ [®] 7箱粒剤 | フルビ [®] リシ [®] ン・フ [®] ロベ [®] ナ [®] ール粒剤 | イナゴ [®] 類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植3日前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネト [®] オイムシ | | | | | | |
| | | イネヒカモク [®] リハ [®] エ | | | | | | |
| | | イネミス [®] ゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ウナカ [®] 類 | | | | | | |
| | | ツマゲ [®] ロヨコバ [®] イ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタビ [®] コヤカ [®] | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | |
| ア [®] ライフェルテラ [®] 粒剤 | クロラントリニア [®] ロール・フ [®] ジ [®] ニル粒剤 | イネト [®] オイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時覆土前 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 本剤の所定量を育苗箱の床土に均一に混和する。 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 本剤の所定量を育苗箱の床土に均一に混和する。 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネヒカモク [®] リハ [®] エ | | は種前 | | | | |
| | | イネミス [®] ゾウムシ | | は種時覆土前 | | | | |
| | | いもち病 | | は種前 | | | | |
| | | コブ [®] メイガ [®] | | は種時覆土前 | | | | |
| | | ツマゲ [®] ロヨコバ [®] イ | | は種前 | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | は種時覆土前 | | | | |
| | | フタビ [®] コヤカ [®] | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | |
| アンコール箱粒剤 | クロラントリニア [®] ロール・トリブル [®] ミ [®] ビ [®] リム [®] ・トリックラ [®] ール粒剤 | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植3日前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネト [®] オイムシ | | | | | | |
| | | イネミス [®] ゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ウナカ [®] 類 | | | | | | |
| | | コブ [®] メイガ [®] | | | | | | |
| | | ツマゲ [®] ロヨコバ [®] イ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタビ [®] コヤカ [®] | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------|--|----|-----|
| シャリオ箱粒剤 | イミダクロプリド・スピノサド・イソチアネルチルガミド粒剤 | イトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植2日前～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イトロイムシ | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | 移植当日 | | | | |
| | | ウカ類 | | | | | | |
| | | コブメイガ | | | | | | |
| | | ツマグロヨコバイ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | アオヒコヤガ | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| スタクトラントツ箱粒剤 | クロチアジブ・イソチアネルチルガミド粒剤 | イトロイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | イトヒカモゲリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | ウカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | アオヒコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農業の農業登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農業登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | |
|----------|---|---------------|---|----------------------|--|---|----|-----|----------------------|----|--|---|---|
| | | 内類褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | スカタバディート箱粒剤 | シアンリブロールイフニル粒剤 | イゴ類 | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I |
| | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| イネトオムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| イネハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| イネミスゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に登録している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、登録しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----|-------|---------------|---|----------------------|---------|--|----|-----|
| | | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | マクノコバノイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | コメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ヒトビノカンカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | マカヒノコバノイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---------|--|----|-----|-------------------------------|---|----|--|---|---|-------------------------------|---|----|--|---|---|-------------------------------|---|----|--|---|---|-------------------------------|---|----|--|---|---|-------------------------------|---|----|--|---|---|---------------|--|---|---|---------------|--|---|---|---------------|--|---|---|---------------|--|---|---|---------------|
| ツインキック箱粒剤 | シアントラニリブ・ロール・トルブ・ロルブ 粒剤 | けご 類 イネツトムシ イネトコイムシ イネヒカモガリハエ イネミスヅカムシ いもち病 コカイチュウ フタヒコヤガ もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ツインバティート箱粒剤 | シアントラニリブ・ロール・イリフ・ニル粒剤 | けご 類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | イネツトムシ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | イネトコイムシ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | イネヒカモガリハエ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | イネミスヅカムシ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | いもち病 | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コカイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | フタヒコヤガ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ツマゲロコハエ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | コカイチュウ | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種時(覆土前)～移植当日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | は種前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------|---|---------------|---|----------------------|---------|--|----|-----|
| | | ヒトビウカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | アビコヤク | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| デジナルコラトップアキラ箱粒剤 | チアマトキサム・ヒ・ロキロン粒剤 | イネカハムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 育苗箱中の苗の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植当日 | | | | |
| | | イネトイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植前3日～移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植前3日～移植当日 | | | | |
| イネミスズガムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植前3日～移植当日 | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植前3日～移植当日 | | | | | | |
| いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植前3日～移植当日 | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植前3日～移植当日 | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|--|-------------|---------|-----------------|----|-----|-------------------------------|------------|----|-----------------|---|---|
| | | カカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | ツマゲ 日コハ イ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| デンジタルミネット 箱粒剤 | シアントラニリブ ロール・ピロ ン粒剤 | イナゴ 類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植10日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | イネト オイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | イネヒカモガ リバ エ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | イネミス ゴウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植10日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植10日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| | | コブ ノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ツマゲ 日コハ イ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ヒトビ ムシカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | フタバ コヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | トリプルキック箱 粒剤 | シアントラニリブ ロール・シメオ ゾール・トリス ロルブ 粒 剤 | イナゴ 類 | | | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | | | イネツトムシ | | | | | | 移植3日前~移植当日 | | | | |
| イネト オイムシ | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | |
| イネヒカモガ リバ エ | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | |
| イネミス ゴウムシ | | | | 移植3日前~移植当日 | | | | | | | | | | |
| いもち病 | | | | 移植当日 | | | | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | | | | | | | | | | | | | | |
| フタバ コヤガ | | | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲こうじ病 | | | | | | | | | | | | | | |
| 内穎褐変病 | | | | | | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | | | | | | | | | | | | | | |
| 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨黒穂病 | | | | | | | | | | | | | | |
| 紋枯病 | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に登録している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、登録しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ファーストオビバ デイト粒剤 | シアントラニリブ [®] ロール・ブ ロベ [®] ナリ [®] ニル粒剤 | イナゴ類 | 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | イネミス [®] ヲウムシ | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | いもち病 | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチユウ | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| ヒメビ [®] ウンカ | は種時(覆土前) | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | は種時(覆土前) | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファーストオビバ [®] フェ ルテラ粒剤 | シアントラニリブ [®] ロール・ブ ロベ [®] ナリ [®] ニル粒剤 | イネトムシ | 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | いもち病 | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチユウ | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種前 | | | | | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | |
| | | フタオビ [®] コヤカ [®] | | は種時(覆土前) | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | は種時(覆土前) | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | は種時(覆土前) | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フイゲ [®] ャットハ [®] デイト粒剤 | シアントラニリブ [®] ロール・チアシ ニル粒剤 | イナゴ類 | 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | 緑化期～移植当日 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | | | | | |
| | | イネトムシ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | イネト [®] オイムシ | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | |
| | | | | イネト [®] オイムシ | | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | |
| | | イネト [®] オイムシ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | |
| | | | | イネト [®] オイムシ | | | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | |
| | | いもち病 | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | |
| | | | | いもち病 | | | | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | コブ [®] ノメイカ [®] | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | |
| | | | | コブ [®] ノメイカ [®] | | | | | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | |
| | | | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | | | | | | | | | | 緑化期～移植当日 | | | | |
| | | ニカメイチユウ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | |
| ニカメイチユウ | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒメビ [®] ウンカ | 移植3日前～移植当日 | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒメビ [®] ウンカ | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | 移植3日前～移植当日 | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタオビ [®] コヤカ [®] | | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 移植3日前～移植当日 | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | 移植3日前～移植当日 | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フイゲ [®] ャットフェルテ ラ [®] ャロニル粒剤 | シアントラニリブ [®] ロール・トリ ルメゾ [®] ヒ [®] リム [®] ・チアシ [®] ニル粒剤 | | | | | イネトムシ | 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5%) 1箱当り50g | 緑化期～移植当日 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | | |
| | | | | | | イネト [®] オイムシ | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | イネト [®] オイムシ | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | |
| | | | | | | いもち病 | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | いもち病 | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | |
| | | | | | | ウンカ類 | | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | |
| | | | | | | コブ [®] ノメイカ [®] | | | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | |
| | | コブ [®] ノメイカ [®] | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | | | | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 |
| | | ツマク [®] ロコバ [®] イ | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ニカメイチユウ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチユウ | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | フタオビ [®] コヤカ [®] | | | | | | | | | | | | | |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | 移植3日前～移植当日 | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | | 緑化期～移植当日 | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 内臓褐変病 | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | | |
| 内臓褐変病 | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | | |
| 白葉枯病 | | 緑化期～移植当日 | | | | | | | | | 育苗箱の床土に均一に散布する。 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|---------|--|----|-----|-------|--|
| ブイゲツフェルトラチスL粒剤 | クロラントリリアール・ピメトリン・チアジニル粒剤 | イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植3日前～移植当日 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | |
| | | イネトコイシ | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | | | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | | | |
| | | ツマクノコバノイ | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | | | |
| | | フタビコヤカ | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | | | |
| ブイゲツフェルトラチスL粒剤 | クロラントリリアール・チアジニル粒剤 | イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | |
| | | イネトコイシ | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | イネヒカモクガリハエ | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | 移植当日 | | | | | | |
| | | ツマクノコバノイ | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | | | |
| | | フタビコヤカ | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | 移植3日前～移植当日 | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | 緑化期～移植当日 | | | | | | |
| | | ブーンパティート箱粒剤 | | シアントリリアール・チアジニル・クロベンチアゾクス粒剤 | | | | | イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) |
| 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | | | |
| イネトコイシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | は種時(覆土前)～移植当日 | | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| イネヒカモクガリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | 移植当日 | | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| イネミスヅウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | は種時(覆土前)～移植当日 | | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | は種前 | | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | 移植当日 | | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| ツマクノコバノイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | 移植当日 | | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | 移植当日 | | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | |
| ヒメビコウカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | 移植当日 | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | |
| | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|---------------|---------|-----------------|----|-----|------|--|--|--|--|--|
| | | フオビコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | | | | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | 移植当日 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ヨハバ®LUG箱粒剤 | テラリア®ロール・ビートロジン・イフアニル粒剤 | イゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | イネトヨムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | イネヒカゲリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | イネミスリウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ウカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ツマクロコバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | フオビコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | |
|-------------|---|---------------|--|----------------------|---------|---|----|-----|--|
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | | | | | |
| ヨバルトップ® 箱粒剤 | テトラリブ® ロール・イフアール® 粒剤 | イネノ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | イネトモイシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | イネヒカモクシガハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | 移植3日前~移植当日 | | | | | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| | | ツマクノヨコハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | | | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | |
| ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | | | |
| ワタビノコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|---|-------------------------------|---|---|-----------------|---------|---------------------|----|-----|
| | | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種時(覆土前) | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~75g | 移植3日前~移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| ルーチアトスピノGT箱粒剤 | イミダクロリド・スピノト・イソチアノル・チルガミド粒剤 | イネツトム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植2日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネトコイシ | | | | | | |
| | | イネミズゾウシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | カンカ類 | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ツマゲロコハイ | | | | | | |
| | | ニカメチユウ | | | | | | |
| | | ワタビコヤガ | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | 移植当日 | | | | |
| 内穎褐変病 | | 移植2日前~移植当日 | | | | | | |
| 白葉枯病 | | | | | | | | |
| 紋枯病 | | | | | | | | |
| ルーチアトスピノ箱粒剤 | イネサミマ | イネツトム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植2日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | |
| | | イネツトム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | イネトコイシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | イネヒカモクリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| | | イネミズゾウシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | |
| いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | |
| 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | | | | | |
| カンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----|-------|---------------|--|---------------|---------|---------------------|----|-----|
| | | コブノメイガ | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ツマゲロヨコイ | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | フオビコヤカ | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)～移植当日 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種前 | | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | 移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | は種時(覆土前) | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | 移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50g | 移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %)1箱当り50~100g) | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|--------|--------------------|--------|---|----------------------|---------|--|----|-----|
| 稲名人箱粒剤 | ボキサゾスルフィル・イソシアニル粒剤 | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | イナゴ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | イナゴ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | イナゴ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | イナゴ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----|-------|---------------|---|----------------------|---------|--|----|-----|
| | | カカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | コメメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ツマゲ'ロコバ'イ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | ワタヒ'コヤカ' | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|--|---------------|--|------------|---------|-----------------|----|-----|
| 箱いり娘粒剤 | 加チアジソン・ズピネトラム・イリチアニル・フラマトビル粒剤 | イネトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | 移植7日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネトコイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | イネヒメコガリハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | イネミスソウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ウカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ツマゲロコハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | フタヒコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------|-------------------|-----------|---|----------------------|---------|--|----|-----|
| 箱王子粒剤 | カブチン・ステトラム・イプフル粒剤 | 紋枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | イネツトム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | イネトイム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | イネヒカモクガハエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | 移植3日前～移植当日 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | イネスゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | カカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | コブメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | ツマクヨコカイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | ツバキコガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50～100g) | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)～移植当日 は種前 | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | |
|----------|---|---------------|---|----------------------|---------|---|----|-----|------------|----|-----------------|---|---|
| | | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 普 | I | | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 は種前 | | 育苗箱の上から均一に散布する。 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | | | | | | | |
| | | 箱大臣粒剤 | 加チニジン・イツァニル・フラムトール粒剤 | イネトコイムシ | | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | 移植7日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | | | | | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | |
| イネミスゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| カンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| ツマクノコバエ | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| フタビコヤカ | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50g | | | | | | | | | | | | |
| | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm,使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・育苗箱施薬剤は単剤、混合とも記載しています。・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。
- ・この項目に記載している農薬の農薬登録において、令和4年1月1日以降に希釈倍数・使用量に「高密度には種する場合」の農薬登録があった場合は、記載しているとみなします。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------|--------------------------------|---------------|--|---------------|---------|-----------------|----|-----|
| | | 内類褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 紋枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| 防人箱粒剤 | カロナリニリアム ロール・トリプルメゾヒール・イナアール粒剤 | イネツトム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 普 | I |
| | | イネトコイム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | イネスズグム | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ウカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ツマクノヨコハ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | アザビコヤク | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 内類褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | | | | | |
| | | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | | | | |

(3) は種同時土中施用

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------|---------|--------------------|----|-----|
| Dr.オリゼ [®] ハテイト粒剤 | シアントラニプロール・プロベナゾール粒剤 | イネミズゾウムシ いもち病 | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| Dr.オリゼ [®] フェルテラグレートM粒剤 | クロラントラニプロール・チフルサミド・プロベナゾール粒剤 | イネド [®] ロオイムシ イネミズゾウムシ いもち病 | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| Dr.オリゼ [®] フェルテラ粒剤 | クロラントラニプロール・プロベナゾール粒剤 | イネド [®] ロオイムシ イネミズゾウムシ いもち病 | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| スタウトダントツ箱粒剤 | クロチアニジン・イソチアール粒剤 | イネド [®] ロオイムシ イネミズゾウムシ いもち病 | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| ダントツ箱粒剤 | クロチアニジン粒剤 | イネド [®] ロオイムシ イネミズゾウムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------|-----|----|--------------------|---|---|
| デジタルミネット箱 粒剤 | シアントラニプロール・ピロキロン粒剤 | イネスゾウムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| | | いもち病 | | | | | | |
| ブイゲットパティール ト粒剤 | シアントラニプロール・チアジニル粒剤 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| 箱いり娘粒剤 | クロチアニジン・スピロトラム・イソチアニル・フラメピル粒剤 | イネツトムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| | | イネドロオイムシ | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオヒコヤカ | | | | | | |
| 紋枯病 | | | | | | | | |
| 箱王子粒剤 | クロチアニジン・スピロトラム・イソチアニル粒剤 | イネツトムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| | | イネドロオイムシ | | | | | | |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオヒコヤカ | | | | | | |
| 箱大臣粒剤 | クロチアニジン・イソチアニル・フラメピル粒剤 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |

(4) 側条施用

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|----------------------|------------------------------|----------|--------------|-------|---------|-------------------------|----|-----|
| オリゼート粒剤 | フロベナゾール粒剤 | いもち病 | 3kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| オリゼート粒剤20 | フロベナゾール粒剤 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| オリゼート顆粒水和剤 | フロベナゾール水和剤 | いもち病 | 500g/10a | 移植時 | 1回 | ペースト肥料に混合し側条施肥田植機で施用する。 | 普 | I |
| | | | | 湛水直播時 | | ペースト肥料に混合し側条施肥は種機で施用する。 | | |
| ハダシSG水溶剤 | カルタップ水溶剤 | イトロイムシ | 100～200g/10a | 移植時 | 1回 | ペースト肥料に溶かし側条施肥田植機で施用する。 | 劇 | I |
| | | イネミスゾウムシ | 200g/10a | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| Dr.オリゼートマイヤー箱粒剤 | イミダクロプリト・フロベナゾール粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | ツマカクヨコバイ | | | | | | |
| Dr.オリゼートデイト粒剤 | シアントラニプロール・フロベナゾール粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| Dr.オリゼートフェルテラグレータム粒剤 | クロラントリニプロール・チフルザミド・フロベナゾール粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| Dr.オリゼートフェルテラ粒剤 | クロラントリニプロール・フロベナゾール粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| スタウトタントツ箱粒剤 | クロチアニン・イソチアニル粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| スタウトデイト箱粒剤 | シアントラニプロール・イソチアニル粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| ツインキック箱粒剤 | シアントラニプロール・トルプロカルブ粒剤 | イトロイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----|----|---------------------------------|---|---|
| デシタルコラトップ アクタラ箱粒剤 | チアトキサム・ヒロキロン 粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| デシタルミネクト箱 粒剤 | シアントラニリブロール・ ヒロキロン粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| トリプルキック箱粒 剤 | シアントラニリブロール・ シメコナゾール・トルプロ カルブ粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| ブイゲットハイソ ン粒剤 | チアクロフリド・チアシ ニル粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| フェルテラセクサロ ン箱粒剤 | クロラントラニリブロール・ トリフルメゾピリム粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | ツマグロヨコバイ | | | | | | |
| 側条オリゼ・メート スターク顆粒水和 剤 | シノテフラン・フロベナ ゾール水和剤 | イネド・ロオイムシ | 500g/10a | 移植時 | 1回 | ペースト肥料に混合し側 条施肥田植機で施用 する。 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| 側条オリゼ・メート フェルテラ顆粒水和 剤 | クロラントラニリブロール・ フロベナゾール水和 剤 | イネド・ロオイムシ | 500g/10a | 移植時 | 1回 | ペースト肥料に混合し側 条施肥田植機で施用 する。 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| 箱いり娘粒剤 | クロチアニン・スピネ トラム・イソチアニル・フラ メトヒル粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| 箱大臣粒剤 | クロチアニン・イソチア ニル・フラメトヒル粒剤 | イネド・ロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 普 | I |
| | | イネミスゾウムシ | | | | | | |
| | | いもち病 | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |

(5) 本田殺虫・殺菌剤(粒剤タイプ)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
 - ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
 - ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ※本田の殺虫殺菌剤の粒剤タイプ(粒剤、微粒剤、細粒剤、パック剤)は単剤、混合剤とも記載しています。
 次の一覧表に掲載している薬剤以外は、本基準に登録しているとみなしません。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---|---------|----------------------|----|-----|
| オリゼート1キロ粒剤 | フロベナゾール粒剤 | いもち病 | 1~1.3kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | |
| オリゼートリンパール粒剤 | フラメトピル・フロベナゾール粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(褐色菌核病) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病) | | | | | | |
| オリゼート粒剤 | フロベナゾール粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 葉いもちには初発の10日前~初発時穂いもちには出穂3~4週間前 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| もみ枯細菌病 | 移植活着後及び出穂3~4週間前 収穫14日前まで | | | | | | | |
| 白葉枯病 | 出穂3~4週間前 収穫14日前まで | | | | | | | |
| 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 出穂3~4週間前 収穫14日前まで | | | | | | | |
| オリフライト1キロ粒剤 | オキシプロピリン粒剤 | いもち病 | 1kg/10a | 出穂10日前まで ただし、収穫45日前まで | 1回 | 散布 | 普 | I |
| | | ごま葉枯病 | | | | | | |
| | | 黒しゆ病 | | | | | | |
| | | 白葉枯病 | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | | | | | | |
| | | 墨黒穂病 | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| | | 葉鞘腐敗病 | | | | | | |
| ゴウケツ1キロ粒剤 | トルブ・ロカルブ粒剤 | いもち病 | 1kg/10a | 出穂5日前まで 但し、収穫30日前まで | 1回 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| ゴウケツパック | トルブ・ロカルブ粒剤 | いもち病 | 小包装(パック)10個(450g)/10a | 出穂5日前まで 但し、収穫30日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| ゴウケツ粒剤 | トルブ・ロカルブ粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 出穂5日前まで 但し、収穫30日前まで | 1回 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | 3kg/10a | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| コラトップ1キロ粒剤12 | ヒロキロン粒剤 | いもち病 | 1~1.5kg/10a | 葉いもちに対しては初発10日前~初発時 穂いもちに対しては出穂30日前~5日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| コラトップジャンボP | ヒロキロン粉粒剤 | いもち病 | 小包装(パック)10~13個(500~650g)/10a | 葉いもちに対しては初発20日前~初発時 穂いもちに対しては出穂30日前~5日前まで | 2回以内 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 普 | I |
| コラトップリンパール粒剤 | ヒロキロン・フラメトピル粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 出穂30日前~5日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| コラトップ豆つぶ | ヒロキロン剤 | いもち病 | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | 375g/10a | 出穂30日前~5日前まで | | | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
 - ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
 - ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ※本田の殺虫殺菌剤の粒剤タイプ(粒剤、微粒剤、細粒剤、パック剤)は単剤、混合剤とも記載しています。
次の一覧表に掲載している薬剤以外は、本基準に登録しているものとみなしません。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|--|--|--------------|---|--|---------|--|----|-----|
| コラトップ [®] 粒剤5 | ヒ [®] ロキ [®] ン粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 葉いもちに対しては初発10日前~初発時 穂いもちに対しては出穂30日前~5日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | 4kg/10a | 出穂30日前~5日前まで | | | | |
| サブ [®] ラス粒剤 | トル [®] ロカル [®] 粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 出穂5日前まで 但し、収穫30日前まで | 1回 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | もみ枯細菌病 | 3kg/10a | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| フジ [®] ワンパック | イソ [®] ロチオ [®] ン粉粒剤 | いもち病 | 小包装(ハ [®] ッ [®] ク)10~15個(750~1125g)/10a | 葉いもちに対しては初発7~10日前 穂いもちに対しては出穂10~30日前 但し、収穫14日前まで | 2回以内 | 水田に小包装(ハ [®] ッ [®] ク)のまま投げ入れる。 | 普 | I |
| | | 稲こうじ病 | 小包装(ハ [®] ッ [®] ク)15個(1125g)/10a | 出穂10~30日前 但し、収穫14日前まで | | | | |
| フジ [®] ワンモカ [®] ット粒剤 | イソ [®] ロチオ [®] ン-フルトラ [®] ル粒剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 出穂30~10日前 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | 稲こうじ病 | 4kg/10a | | | | | |
| | | 紋枯病 | 3~4kg/10a | | | | | |
| フジ [®] ワン粒剤 | イソ [®] ロチオ [®] ン粒剤 | いもち病 | 3~5kg/10a | 葉いもちに対しては初発7~10日前 穂いもちに対しては出穂10~30日前 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | 稲こうじ病 | 3~4kg/10a | 出穂10~30日前 但し、収穫30日前まで | | | | |
| モカ [®] ット粒剤 | フルトラ [®] ル粒剤 | 紋枯病 | 3~4kg/10a | 出穂30~10日前 但し、収穫14日前まで | 3回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| モカ [®] リット1キ [®] ロ粒剤 | シメコ [®] ザ [®] ール粒剤 | 稲こうじ病 | 1~1.3kg/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | 墨黒穂病 | 1kg/10a | | | | | |
| | | 紋枯病 | 1~1.3kg/10a | | | | | |
| モカ [®] リット粒剤 | シメコ [®] ザ [®] ール粒剤 | 稲こうじ病 | 3~4kg/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(灰色菌核病) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(褐色菌核病) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 4kg/10a | | | | | |
| | | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 3~4kg/10a | | | | | |
| 墨黒穂病 | | | | | | | | |
| 紋枯病 | | | | | | | | |
| リト [®] ミ [®] ル粒剤2 | マ [®] タ [®] キ [®] ル粒剤 | 黄化萎縮病 | 6kg/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| リ [®] ン [®] 粒剤 | アラ [®] ビ [®] ル粒剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病) | 3~4kg/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病) | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| ルー [®] チ [®] ン粒剤 | イソ [®] チ [®] ア [®] ル粒剤 | いもち病 | 1kg/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | 白葉枯病 | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
 - ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
 - ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。
- ※本田の殺虫殺菌剤の粒剤タイプ(粒剤、微粒剤、細粒剤、パック剤)は単剤、混合剤とも記載しています。
次の一覧表に掲載している薬剤以外は、本基準に登録しているとみなしません。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------|---------|--------------------------|----|-----|
| アルパリン粒剤 | ジノテフラン粒剤 | イネト・ロイムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネミス・ゾウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメシ類 | | | | | | |
| | | ツマク・ロヨコバ・イ ニカメイチュウ | | | | | | |
| キラップ粒剤 | エチプロール粒剤 | ウンカ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 普 | I |
| | | カメシ類 | | | | | | |
| ジャンボたにしくん | メタルヒト粒剤 | スクミリンゴガイ | 1~2kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| スクミノ | メタルヒト粒剤 | スクミリンゴガイ | 1~4kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布又は無人航空機による散布(散布のみとする。) | 普 | I |
| スタークル1キロH粒剤 | ジノテフラン粒剤 | イネミス・ゾウムシ | 1kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメシ類 | | | | | | |
| | | ツマク・ロヨコバ・イ ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | イネミス・ゾウムシ | | | | | | |
| ウンカ類 | | | | | | | | |
| カメシ類 | | | | | | | | |
| ツマク・ロヨコバ・イ ニカメイチュウ | | | | | | | | |
| スタークル豆つぶ | ジノテフラン剤 | ウンカ類 | 250~500g/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| カメシ類 | 250g/10a | | | | | | | |
| ツマク・ロヨコバ・イ | 250~500g/10a | | | | | | | |
| スタークル粒剤 | ジノテフラン粒剤 | イネト・ロイムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネミス・ゾウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメシ類 | | | | | | |
| | | ツマク・ロヨコバ・イ ニカメイチュウ | | | | | | |
| ダントツ粒剤 | クロチアジン粒剤 | ウンカ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | カメシ類 | 3~4kg/10a | | | | | |
| | | ツマク・ロヨコバ・イ | 3kg/10a | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| トレボン粒剤 | エトフェンブ・ロックス粒剤 | イコ類 | 2~3kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネゾウムシ | | | | | | |
| | | イネト・ロイムシ | | | | | | |
| | | イネヒメハモク・リハ・エ | | | | | | |
| | | イネミス・ゾウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | ツマク・ロヨコバ・イ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ第1世代 | | | | | | |
| ハダタン粒剤4 | カルタップ粒剤 | アザミウマ類 | 3~4kg/10a | 収穫30日前まで | 6回以内 | 散布 | 劇 | I |
| | | イネツトムシ | | | | | | |
| | | コフノメイカ | | | | | | |
| | | スクミリンゴガイ(食害防止) | 4kg/10a | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | 3~4kg/10a | | | | | |
| ワタビコヤガ | | | | | | | | |

(6) 本田殺虫・殺菌剤(粒剤タイプを除く)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | |
|---|---|---|------------|------------------------------|---------|------|----|-----|--|
| Zホルト [®] -粉剤DL | 銅粉剤 | 稲こうじ病 | 3~4kg/10a | 出穂10日前まで | - | 散布 | 普 | I | |
| | | 墨黒穂病 | 4kg/10a | | | | | | |
| オリアライト250G | ミノストロピン [®] 剤 | いもち病 | 250g/10a | 出穂10日前まで ただし、収穫45日 前まで | 1回 | 散布 | 普 | I | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | | |
| カスミン液剤 | カスガマイシン液剤 | いもち病 | 1000倍 | 穂揃期まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| ダ [®] ブルカットフロア [®] ブル | カスガマイシン・トリク [®] ラゾ [®] ール水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 穂揃期まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | |
| ダ [®] ブルカット粉剤3DL | カスガマイシン・トリク [®] ラゾ [®] ール粉剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 穂揃期まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | |
| トライフロア [®] ブル | テ [®] フロキ [®] ン水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 稲こうじ病 | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | |
| トライ粉剤DL | テ [®] フロキ [®] ン粉剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| ノン [®] ラスフロア [®] ブル | トリク [®] ラゾ [®] ール・フェリ [®] ムゾ [®] ン水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | ごま葉枯病 | | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | | |
| | | 稲こうじ病 | | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | | |
| | | 変色米(アルタリア [®] 菌) | | | | | | | |
| | | 変色米(エビ [®] コカム [®] 菌) | | | | | | | |
| | | 変色米(カ [®] ブ [®] ラリア [®] 菌) | | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | |
| | | ノン [®] ラス粉剤DL | | | | | | | トリク [®] ラゾ [®] ール・フェリ [®] ムゾ [®] ン粉剤 |
| ごま葉枯病 | | | | | | | | | |
| もみ枯細菌病 | 4kg/10a | | | | | | | | |
| 稲こうじ病 | | | | | | | | | |
| 内穎褐変病 | | | | | | | | | |
| 変色米(カ [®] ブ [®] ラリア [®] 菌) | 3~4kg/10a | | | | | | | | |
| 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | | | | |
| 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | | | | | | | | | |
| 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | | | | | | | | | |
| ハ [®] シタック [®] ソ [®] ル | メ [®] ロニ [®] ル水和剤 | 紋枯病 | 800~1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| ハ [®] シタック [®] 水和剤75 | メ [®] ロニ [®] ル水和剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | | |
| | | 紋枯病 | 1000~1500倍 | | | | | | |
| ハ [®] リタ [®] シン液剤5 | ハ [®] リタ [®] マイシン液剤 | もみ枯細菌病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | | |
| ハ [®] リタ [®] シン粉剤DL | ハ [®] リタ [®] マイシン粉剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | | |
| ビ [®] -ム [®] ソ [®] ル | トリク [®] ラゾ [®] ール水 | いもち病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 劇 | I | |
| ビ [®] -ム [®] 粉剤DL | トリク [®] ラゾ [®] ール粉剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 4kg/10a | | | | | | |
| フ [®] ン [®] ワ [®] ン乳剤 | イ [®] フ [®] ロ [®] チ [®] ラン乳剤 | いもち病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | 稲こうじ病 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------|----------------|---------------|------------|----------|---------|------|----|-----|
| ブランチフロアブル | フェリムゾン・フザイト水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ごま葉枯病 | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 稲こうじ病 | | | | | | |
| | | 褐条病 | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| | | 変色米(アルナリア菌) | | | | | | |
| | | 変色米(エビコッカム菌) | | | | | | |
| | | 変色米(カブツリ菌) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | |
| | | 墨黒穂病 | | | | | | |
| ブランチ粉剤DL | フェリムゾン・フザイト粉剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ごま葉枯病 | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 稲こうじ病 | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| | | 変色米(エビコッカム菌) | | | | | | |
| | | 変色米(カブツリ菌) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | | | | | | |
| | | 4kg/10a | | | | | | |
| | | 3~4kg/10a | | | | | | |
| モンカットファイン粉剤20DL | フルトラニル粉剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| モンカットフロアブル | フルトラニル水和剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| モンカット水和剤 | フルトラニル水和剤 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | | | | | | |
| | | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | | | | | | |
| | | 紋枯病 | | | | | | |
| モンセリンフロアブル | ベンシクロン水和剤 | 紋枯病 | 1500倍 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 散布 | 普 | I |
| モンセリン粉剤DL | ベンシクロン粉剤 | 紋枯病 | 3~4kg/10a | 収穫21日前まで | 4回以内 | 散布 | 普 | I |
| ラフサイトフロアブル | フザイト水和剤 | いもち病 | 1000~1500倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| ラフサイト粉剤DL | フザイト粉剤 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| MR. ジョーカー-EW | シラフルフェン乳剤 | イコノ類 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ツマクロヨコバイ | | | | | | |
| | | フタオヒコヤカ | | | | | | |
| MR. ジョーカー粉剤DL | シラフルフェン粉剤 | イコノ類 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネアザミウマ | | | | | | |
| | | イネツトムシ | | | | | | |
| | | イネトノロイムシ | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ成虫 | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ツマクロヨコバイ | | | | | | |
| | | フタオヒコヤカ | | | | | | |
| | | 3kg/10a | | | | | | |
| アルパリン粉剤DL | ジノテフラン粉剤 | イコノ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトノロイムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマクロヨコバイ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオヒコヤカ | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------|---------|------|----|-----|------------|
| アルパ [®] リン顆粒水溶剤 | ジ [®] ノテフラン水溶剤 | ウンカ類 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | 2000倍 | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | 3000倍 | | | | | | |
| エクシード [®] フロアブル | スルホキサフロル水和剤 | イナゴ [®] 類 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | ウンカ類 | | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| エクシード [®] 粉剤DL | スルホキサフロル粉剤 | ウンカ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | | | | | | | |
| エミリアフロアブル | フルビリン水和剤 | ウンカ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | | | | | | | |
| エルサン乳剤 | PAP乳剤 | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 劇 | I | |
| | | イト [®] ロイムシ | 1000~2000倍 | | | | | | |
| | | イネハモク [®] リハ [®] エ | 2000倍 | | | | | | |
| | | イネヒハモク [®] リハ [®] エ | 1500~2000倍 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | 1000倍 | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | 1500~2000倍 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ第1世代 | 1000~1500倍 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ第2世代 | 800~1000倍 | | | | | | |
| | | ヒメトビ [®] ウンカ | 1500~2000倍 | | | | | | |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | 1000倍 | | | | | | | | |
| オーケストラフロアブル | ヘンズ [®] ヒ [®] リモキサ水和剤 | ウンカ類幼虫 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ幼虫 | | | | | | | |
| キラップ [®] フロアブル | エチフ [®] ロール水和剤 | イナゴ [®] 類 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | イト [®] ロイムシ | | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | | |
| キラップ [®] 粉剤DL | エチフ [®] ロール粉剤 | イナゴ [®] 類 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | イト [®] ロイムシ | | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | | |
| スタークルメイト液剤10 | ジ [®] ノテフラン液剤 | ウンカ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | | | | | | | |
| スタークル液剤10 | ジ [®] ノテフラン液剤 | ウンカ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | | | | | | | |
| スタークル粉剤DL | ジ [®] ノテフラン粉剤 | イナゴ [®] 類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | イト [®] ロイムシ | | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | | |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | | | | | | | | | |
| スタークル顆粒水溶剤 | ジ [®] ノテフラン水溶剤 | ウンカ類 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | カメムシ類 | 2000倍 | | | | | | |
| | | ツマグ [®] ロヨコハイ | 3000倍 | | | | | | |
| スミチオン乳剤 | MEP乳剤 | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I | |
| | | アワヨトウ | | | | | | | |
| | | イネシガ [®] レセンチュウ | | | | | | | |
| | | イネツトムシ | | | | | | | |
| | | イト [®] ロイムシ | | | | | | | |
| | | イネハモク [®] リハ [®] エ | | | | | | | 1000~2000倍 |
| | | イネヒハモク [®] リハ [®] エ | | | | | | | 2500倍 |
| | | カメムシ類 | | | | | | | 1000倍 |
| | | ニカメイチュウ第1世代 | | | | | | | 1000~2000倍 |
| | | ニカメイチュウ第2世代 | | | | | | | 800~1000倍 |
| | | ヒメトビ [®] ウンカ | | | | | | | 1000倍 |
| フタオビ [®] コヤカ [®] | 2000~4000倍 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------------|---------------------|------|----|-----|
| スミオン粉剤2DL | MEP粉剤 | ウンカ類 | 3~4kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 (但し、出穂前は1回) | 散布 | 普 | I |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| スミハツサ粉剤20DL | BPMC・MEP粉剤 | イネミスヅウムシ成虫 | 4kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 (但し、出穂前は1回) | 散布 | 普 | I |
| | | ウンカ類 | 3~4kg/10a | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| ダントツアンプル | クロチアニン水剤 | イナゴ類 | 5000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトオイムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| ダントツ水溶剤 | クロチアニン水溶剤 | イネアザミウマ | 4000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトオイムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| ダントツ粉剤DL | クロチアニン粉剤 | イナゴ類 | 4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトオイムシ | 3kg/10a | | | | | |
| | | ウンカ類 | 3~4kg/10a | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| | | フタオビコヤカ | 3kg/10a | | | | | |
| チューンアップ顆粒水剤 | BT水剤 | イネツトムシ | 2000~4000倍 | 発生初期 但し、 収穫前日まで | - | 散布 | - | - |
| | | コブノメイガ | 1000~2000倍 | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオビコヤカ | | | | | | |
| トレボンEW | イトフェンブロックス乳剤 | イナゴ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトオイムシ | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| トレボン乳剤 | イトフェンブロックス乳剤 | イナゴ類 | 1000~2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネトオイムシ | | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ | 2000倍 | | | | | |
| | | ウンカ類 | 1000~2000倍 | | | | | |
| | | カメムシ類 | 2000倍 | | | | | |
| | | コブノメイガ | 1000倍 | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | 1000~2000倍 | | | | | |
| トレボン粉剤DL | イトフェンブロックス粉剤 | アザミウマ類 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イナゴ類 | | | | | | |
| | | イネツトムシ | 4kg/10a | | | | | |
| | | イネトオイムシ | 3~4kg/10a | | | | | |
| | | イネヒハモクリハエ | 3kg/10a | | | | | |
| | | イネミスヅウムシ成虫 | 3~4kg/10a | | | | | |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | コブノメイガ | | | | | | |
| | | ツマクロヨコハエ | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| フタオビコヤカ | 3kg/10a | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は、原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用病害虫名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 | 魚毒性 |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|----|-----|
| なげこみトホ ン | イトフェン [®] ロックス 油剤 | イゴ [®] 類 | 水溶性容器6 ~10個(300~ 500mL)/10a | 5葉期以降 収穫 21日前まで | 3回以内 | 本田に水溶性容器 のまま投げ入れる。 | 普 | I |
| | | イネ [®] カメムシ | | | | | | |
| | | イネ [®] ロイムシ | 水溶性容器4 ~6個(200~ 300mL)/10a | | | | | |
| | | イネ [®] ミス [®] ウムシ | | | | | | |
| | | ウンカ類 | 水溶性容器10 個 (500mL)/10a | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコハイ | | | | | | |
| ニカメイチュウ第1世代 | | | | | | | | |
| ハ [®] タンSG水溶 剤 | カルタップ [®] 水溶剤 | イネ [®] ツトムシ | 1500倍 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 劇 | I |
| | | イネ [®] モク [®] リハ [®] エ | 1500~3000倍 | | | | | |
| | | コブ [®] ノメイガ [®] | 1500倍 | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| ハ [®] タン粉剤DL | カルタップ [®] 粉剤 | アザ [®] ミウマ類 | 3~4kg/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | イネ [®] ツトムシ | | | | | | |
| | | イネ [®] ロイムシ | | | | | | |
| | | コブ [®] ノメイガ [®] | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオビ [®] コヤカ [®] | | | | | | |
| ロムタン粉剤DL | テフ [®] フェノ [®] ド [®] 粉 剤 | イネ [®] ツトムシ | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | コブ [®] ノメイガ [®] | | | | | | |
| | | ニカメイチュウ | | | | | | |
| | | フタオビ [®] コヤカ [®] | | | | | | |
| ダ [®] ブルカッター ルフロアブル | ジ [®] ノテフラン [®] ・カスカ [®] マイシン [®] ・トリシラ ゾ [®] ール水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 穂揃期まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコハイ | | | | | | |
| フ [®] ランジ [®] ヨーカ フロアブル | シラフルフェン [®] ・フェリ ムゾン [®] ・フサライド [®] 水和剤 | いもち病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 普 | I |
| | | ウンカ類 | | | | | | |
| | | カメムシ類 | | | | | | |
| | | コブ [®] ノメイガ [®] | | | | | | |
| | | ごま葉枯病 | | | | | | |
| | | ツマク [®] ロコハイ | | | | | | |
| | | もみ枯細菌病 | | | | | | |
| | | 稲こうじ病 | | | | | | |
| | | 内穎褐変病 | | | | | | |
| | | 変色米(アルタナリア菌) | | | | | | |
| | | 変色米(エビ [®] コッカム菌) | | | | | | |
| | | 変色米(カブ [®] ラリア菌) | | | | | | |
| | | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | | | | | | |

（7）除草剤

◆除草剤共通の注意事項

※使用の際、環境への影響を考慮し、畦畔等からの漏水防止と農薬散布後1週間は止水を行う（落水、かけ流しはしない）。

※除草剤によっては使用方法として水口施用できる薬剤もあるが、本県では水口施用は行わないよう指導する。

①移植用 一発処理剤

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------|---|--|--------------|--|-------------|---|----------|---|----|---------|
| アックス MX1 粒剤 | ピリフタリド・ メトリアン・メ ゾスルフロ ン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後7日 ～レ ¹ E4葉 期 ただし、 収穫45日前 まで | 1回 | 湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| アットウZ1粒 剤 | テフリルトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスル フロ ン粒剤 | アミトド・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | アミトド・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| アットウ Z400FG | テフリルトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスル フロ ン粒剤 | アミトド・藻類による表層はく離 | 400g/10 a | 移植後3日 ～レ ¹ E3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アットウZ ¹ ン ホ ¹ | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|---|--|----------------------------------|---|---------|---|---|---|
| アットウZフロ ブル | テフルトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスル ロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レ ¹³ 葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I | | | |
| | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| アッパレZ1キ ロ粒剤 | ピラクロニル・ プロピリスル ロン・プロモ チド粒剤 | アオイトロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | アッパレ Z400FG | | ピラクロニル・ プロピリスル ロン・プロモ チド粒剤 | アオイトロ・藻類による表層はく離 | 400g/10 a | 移植後3日 ～レ ¹³ 葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみ とす る。 | 普 | I |
| | | | | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | | | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | |
| | | | | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | | | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | | | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | | | | シスイ | | | | | | | | |
| | | | | | セリ | | | | | | | | |
| | | | | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | | | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草及び多年生広葉雑 草 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|--|----------------|---------------------------------------|--|-------------|--|----------|------------------------------|----|---------|
| アップルZ ジャンボ | ビラクロニル・ プロピリスル ロン・プロモフ チド 粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後3日 ～レI3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤナカサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アップルZ アブル | ビラクロニル・ プロピリスル ロン・プロモフ チド 水和剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レI3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤナカサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アネシ1キ 粒剤 | ビラゾスル フロン・エチル プロタク ロール・ベンゾ ビシクロン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| イッテツ1キ 粒剤 | イマゾスル フロン・カフェ ンスト ロール・ベンゾ ビシクロン粒 剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植後5日 ～レI2.5葉 期 だ だし、移 植後 30日 まで | 1回 | 湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| イッテツジ ャン ボ | イマゾスル フロン・カフェ ンスト ロール・ベンゾ ビシクロン粒 剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～レI2.5葉 期 だ だし、移 植後 30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|----------|--------------|--------|-------------|--|------------------|------------|-----|----|------------|--|--|---|---|
| イッテツフロアブル | イマゾスルフロン・カフェンソール・ベンゾピシクロン水和剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植後5日～ $\text{L}^{\circ}\text{E}2.5$ 葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | | 原液湛水散布のみとする。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | エゾノヤスカグサ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イネキング1キロ粒剤 | ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アオミドロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | | 移植直後～ $\text{L}^{\circ}\text{E}2.5$ 葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 湛水散布のみとする。 | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イネキングジャンボ | ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装（パック）10個（500g）/10a | 移植後1日～ $\text{L}^{\circ}\text{E}2.5$ 葉期、ただし移植後30日まで | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イネキングフロアブル | | | | | | | | | ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | 移植直後～ $\text{L}^{\circ}\text{E}2.5$ 葉期 ただし、移植後30日まで | | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 原液湛水散布のみとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--|---|---|---------------|---|-------------|------------|------------|----|--------|-------------|
| イノバ [®] DX アップ1 [®] α 粒剤51 | ダ [®] イム [®] ・フェ ントラザ [®] ミド [®] ・ プロモ [®] チ ト [®] ・ヘン [®] スル [®] ロメチ [®] ル粒剤 | アオミ [®] ド [®] ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 砂壤土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカ [®] | | 移植直後～ ル [®] E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布 | | | | |
| | | オモダ [®] カ | | | | | | | | |
| | | クロク [®] ワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ [®] イ | | | | | | | | |
| | | ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アオミ [®] ド [®] ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| | | ウリカ [®] | | | | | | | | |
| | | オモダ [®] カ | | | | | | | | |
| | | クロク [®] ワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ [®] イ | | | | | | | | |
| | | ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| イノバ [®] DX アップL [®] フロア ブル | ダ [®] イム [®] ・フェ ントラザ [®] ミド [®] ・ プロモ [®] チ ト [®] ・ヘン [®] スル [®] ロメチ [®] ル水和 剤 | アオミ [®] ド [®] ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 砂壤土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカ [®] | | 移植直後～ ル [®] E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 原液湛 水散布 | | | | |
| | | オモダ [®] カ | | | | | | | | |
| | | クロク [®] ワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ [®] イ | | | | | | | | |
| | | ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|----------------|----|--------|-------------|
| イノバトリオ 1キロ粒剤 51 | フェントラザミ ド・プロモフ チド・ベンシル フロメチル粒 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (九州を除く) | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(九州を除く) | | | | | | | | |
| | | クロゲワイ(九州を除く) | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (九州を除く) | | 移植直後～ ル ¹ E2.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布 | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(九州を除く) | | | | | | | | |
| | | クロゲワイ(九州を除く) | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| イノバトリオ Lジャンボ | フェントラザミ ド・プロモフ チド・ベンシル フロメチル粒 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後3日 ～ル ¹ E2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ入 れる。 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| イノバトリオ L70アブル | フェントラザミ ド・プロモフ チド・ベンシル フロメチル水 和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (関東以西) | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | ウリカワ | | | | | | | | | |
| | | セリ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (関東以西) | | 移植直後～ ル ¹ E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 原液湛 水散布 | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------|----|---------|
| ウイナ-1キロ 粒剤51 | イフ [®] フェンカル バ [®] ソ [®] ン [®] ・フ [®] ロ モ [®] チ [®] ・ベ [®] ン [®] ス [®] ル [®] フ [®] ロ [®] ン [®] メ [®] チ [®] ル 粒剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/2エ2.5葉期 但し、移植後30日まで | | | | | | |
| ウイナ-1ジャンボ | イフ [®] フェンカル バ [®] ソ [®] ン [®] ・フ [®] ロ モ [®] チ [®] ・ベ [®] ン [®] ス [®] ル [®] フ [®] ロ [®] ン [®] メ [®] チ [®] ル 粒剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック)10個 (500g)/ 10a | 移植直後～ 1/2エ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 水口施用又は水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる、のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ウイナ-1フロアブル | イフ [®] フェンカル バ [®] ソ [®] ン [®] ・フ [®] ロ モ [®] チ [®] ・ベ [®] ン [®] ス [®] ル [®] フ [®] ロ [®] ン [®] メ [®] チ [®] ル 水和剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/2エ2.5葉期 但し、移植後30日まで | | | | | | |
| | | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------|---|--|---------------------------------------|---|-----------------|--|----------|--|--------|-------------|
| ウイングラン 1kg粒剤 | イフフェンカル バゾン・プロ モフチド・ヘ ンスルフロメチル 粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ L12.5葉 期但し、移 植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | |
| ウイングラン ジヤンボ | イフフェンカル バゾン・プロ モフチド・ヘ ンスルフロメチル 粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植直後～ L12.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水口施 用又は 水田に 小包装 (パッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | 水田 に小 包装 (パッ ク)の まま 投げ 入 れる、 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | |
|------------------|--|--|---------------------------------------|---|------------------------|---|----------|------------------------------|----|---------|--|---|------------------------------|
| ウイニングラン フロアブル | イブフェンカル バゾン・プロ モフチド・ヘ ンスルフロメチル 水和剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | | | 普 | I | | | |
| | | ウリカク | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| クログワイ | | | | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ルイ2.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | | | | | | | | | | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | 原液 湛水 散布 のみと する。 |
| ウリカク | | | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| クログワイ | | | | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| ウルティモZ1キ ロ粒剤 | シクロピリメロ ト・ピラゾレ ト・フロピリス ルフロノ粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | | | 普 | I | | | |
| | | エゾノヤブカクサ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ルイ3.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | 湛水 散布 のみと する。 | | | | | | | | |
| エゾノヤブカクサ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| ウルティモZ ジャンボ | シクロピリメロ ト・ピラゾレ ト・フロピリス ルフロノ粒剤 | エゾノヤブカクサ | 小包装 (パック) 10個 (350g)/ 10a | 移植後5日 ～ルイ3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| ウルティモZ フロアブル | シクロピリメロ ト・ピラゾレ ト・フロピリス ルフロノ水和 剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～ルイ3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I | | | |
| | | エゾノヤブカクサ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------------|----------------------------------|----|---------|------|-------|--------|----|-------|--------|------|-------|--------|-------|
| エーワンキ 粒剤 | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日 ～/レ ¹ 3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | 砂壤 土～ 埴土 | 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エーワンジ ャン ホ | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (300g)/ 10a | 移植後5日 ～/レ ¹ 2.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ(北海道、東北を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エーワンフロ ア ブル | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～/レ ¹ 3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 又は無 人ヘリコ プターに よる滴 下 | 砂壤 土～ 埴土 | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンパ ラーキ ロ粒剤 | ピラクロニル・ ピリミノパ ック メチル・フェンキ トリオン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アオミドロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ /レ ¹ 3葉期 但し、収穫 75日前まで | | ウリカワ | | | | | オモダカ | クログワイ | コウキヤガラ | セリ | ヒルムシロ | ハラオモダカ | ホタルイ | マツバ イ | ミスガヤツリ | 一年生雑草 |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバ イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | |
|---------------|---|------------------|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----|------------------------------|---------|---|------------------|---------------|
| エンペラー ジャンボ | ピラクロニル・ ピリミノパック メチル・フェンキ トリオン剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植直後～ L ¹ E3葉期 但し、移植 後30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | エンペラー アブル | | | | | | | | | ピラクロニル・ ピリミノパック メチル・フェンキ トリオン水和 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a |
| ウリカワ | | | | | | | | | | | | | |
| エゾノサヤヌカクサ | | | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ L ¹ E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | | | | |
| | | | ウリカワ | | | | | | | | | | |
| | | | エゾノサヤヌカクサ | | | | | | | | | | |
| | | | オモダカ | | | | | | | | | | |
| | | | クロクワイ | | | | | | | | | | |
| | | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| | | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| | | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| | | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| | | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | | エンペラー 豆 つぶ250 | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------|--|----------|--|--------|-------------|----------------------------|
| カイキZ1キ 粒剤 | イ [°] フェンカル バ [°] ゾン・テリ ルトリオン・フ [°] ピ [°] リスルフロン 粒剤 | アミト [°] ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | 移植直後～ レ [°] I3葉期 但し、移植 後30日まで | | 湛水散布 又は無人 航空機に よる散布 | | | | | 湛水 散布 のみ とす る。 |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| カイキZン ホ [°] | イ [°] フェンカル バ [°] ゾン・テリ ルトリオン・フ [°] ピ [°] リスルフロン 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パ [°] ッ ク)10個 (300g)/ 10a | 移植後3日 ～レ [°] I3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水口施 用又は 水田に 小包装 (パ [°] ッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | 水田に 小包装 (パ [°] ッ ク)の まま投 げ入 れる、 のみと する。 | 普 | I | |
| | | オモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | クロク [°] ワイ | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ [°] ラ | | | | | | | | | |
| | | ゼリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツバ [°] イ | | | | | | | | | |
| | | ミス [°] ガヤツリ | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| カイキZフロ ア [°] | イ [°] フェンカル バ [°] ゾン・テリ ルトリオン・フ [°] ピ [°] リスルフロン 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レ [°] I3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I | |
| | | オモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | クロク [°] ワイ | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ [°] ラ | | | | | | | | | |
| | | ゼリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツバ [°] イ | | | | | | | | | |
| | | ミス [°] ガヤツリ | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| カウシコン プ [°] リート1キ 粒剤 | テフリルトリオン・ トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | |
| | | エゾ [°] ノサヤヌカ [°] サ | | | | | | | | | |
| | | オモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | キシュウス [°] メノヒエ | | | | | | | | | |
| | | クロク [°] ワイ | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ [°] ラ | | | | | | | | | |
| | | シス [°] イ | | | | | | | | | |
| | | ゼリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツバ [°] イ | | | | | | | | | |
| | | ミス [°] ガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ レ [°] I3.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみ とす る。 | | | |
| | | エゾ [°] ノサヤヌカ [°] サ | | | | | | | | | |
| | | オモダ [°] カ | | | | | | | | | |
| | | キシュウス [°] メノヒエ | | | | | | | | | |
| | | クロク [°] ワイ | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ [°] ラ | | | | | | | | | |
| シス [°] イ | | | | | | | | | | | |
| ゼリ | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダ [°] カ | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| マツバ [°] イ | | | | | | | | | | | |
| ミス [°] ガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---|----------|------------------------------|--------|-------------|
| カウシルコン プリートジヤ ンホ | テフリルトリオン・ トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a | 移植後5日 ～/レ ¹ E3.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | キシュウス ^メ ノヒエ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カウシルコン プリートフロア ブル | テフリルトリオン・ トリアファモン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～/レ ¹ E3.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | キシュウス ^メ ノヒエ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カチホ ^シ 1キ 粒剤51 | イ ^フ フェンカル パ ^ソ ン・テフリ ルトリオン・ベン スルフロンメチル 粒剤 | アミト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト ^ロ ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カチホ ^シ ジヤンホ | イ ^フ フェンカル パ ^ソ ン・テフリ ルトリオン・ベン スルフロンメチル 粒剤 | アミト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a | 移植直後～ /レ ¹ E2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---------------|---|---|---------------|---|-----------------|--|----------|------------------------------|--------|-------------|
| カネシロ アブル | イフェンカ ルバゾン・テ フルリオン・ベ ン スルフロメチ ル水和剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ レ ¹ E2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人ヘリ コプターに よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| カツツZ1キ ロ粒剤 | テフルリオン・ フロピリスル ロン粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ レ ¹ E3葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------|----|---------|
| ガットZ200FG | テフルトリオン・プロピリスルホン粒剤 | アミド・藻類による表層はく離 | 200g/10a | 移植後3日～13葉期ただし、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布、湛水周縁散布のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ガットZジャンボ | テフルトリオン・プロピリスルホン粒剤 | アミド・藻類による表層はく離 | 小包装（パック）10個（200g）/10a | 移植後3日～13葉期ただし、移植後30日まで | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ガットZフロアブル | テフルトリオン・プロピリスルホン水和剤 | アミド・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植後3日～13葉期ただし、移植後30日まで | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | | 原液湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| カリート1キロ粒剤 | ピラクロニル・ベンゾピリソロン・ベンゾフェナップ粒剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | 移植直後～12.5葉期ただし、移植後30日まで | | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 原液湛水散布のみとする。 | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | |
|---|--|------------------------------|--|--|-----------------|--|----------|--|--------|-------------|------------------------------|
| カユート [®] フロ アブル | ピラクロニル・ ベンゾピシ ロン・ベンゾ フェナップ [®] 水 和剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | |
| | | イゾノサヌカグサ | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | |
| | | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ヒ [®] E2.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | | | | 原液 湛水 散布 のみと する。 |
| | | イゾノサヌカグサ | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | |
| キマリテ1キ 粒剤 | イ [®] フェンカル パ [®] ゾン・テフ ルトリオン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | |
| | | シズイ | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ ヒ [®] E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | | 湛水 散布 のみと する。 |
| | | オモダカ | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | |
| | | シズイ | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| キマリテジ [®] ヤ ン ホ [®] | イ [®] フェンカル パ [®] ゾン・テフ ルトリオン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク) 10個 (300g)/ 10a | 移植直後～ ヒ [®] E3葉期 但し、移植 後30日まで | 1回 | 水口施 用又は 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | 水田 に小 包装 (パッ ク) の まま 投げ 入れ る、 のみ とす る。 | 普 | I | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | |
| | | シズイ | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------|--------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------|----|--------|-------------|
| キマテフロアブル | イブフェンカルバゾン・テフトリオン水和剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クログワイ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/13葉期 但し、移植 後30日まで | | 原液湛水散布、 水口施用又は 無人ヘリコプターによる 滴下 | | | | |
| クサツタ1キロ粒剤 | ジメタメリン・ピラゾレート・フレチクロール・プロモプチド粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/12葉期 ただし、移植 後30日まで | | 湛水散布 | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|----|----|---------|
| クサハルカン 1 粒剤 | ビラクロニル・ ピラゾレート・ ペンゾピシ ロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クログワイ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ L12.5葉期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | |
| クサハルカン シ ャンホ | ビラクロニル・ ピラゾレート・ ペンゾピシ ロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植後1日 ～L12.5 葉期、た だし移植 後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クログワイ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| クサハルカン フ ロアフル | ビラクロニル・ ピラゾレート・ ペンゾピシ ロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クログワイ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ L12.5葉期 ただし、 移植後30日 まで | | 原液湛 水散布 又は無 人航 空機に よる滴 下 | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------|---|----------|----|----|---------|
| コイモンキ 粒剤 | イフエンカル バゾン・イマ ゾスルフロ ン・プロモ チド 粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ ルイ2.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | | | |
| コイモンヤ ンホ | イフエンカル バゾン・イマ ゾスルフロ ン・プロモ チド 粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a | 移植直後～ ルイ2.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に小包装 (パック) のまま投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--|---|---|-------------|--|-------------|------------|----------|----|--------|-------------|
| ゴ ^レ イ ^ン フ ^ロ ア ^ブ ル | イ ^フ ・フェ ^ン カ ^ル バ ^ズ ン・イ ^マ ゾ ^ス ル ^フ ロ ^ン ・ プ ^ロ モ ^フ チ ^ド 水 ^和 剤 | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウ ^リ カ ^ワ オ ^モ タ ^カ ク ^ロ ク ^ワ イ コ ^ウ キ ^ヤ ガ ^ラ シ ^ズ イ セ ^リ ヒ ^ル ム ^シ ロ ヘ ^ラ オ ^モ タ ^カ ホ ^{タル} イ マ ^ツ バ ^イ ミ ^ズ ガ ^ヤ ツ ^リ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ ル ^レ イ ^{2.5} 葉期 ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| ゴ ^ー ル ¹ キ ^ロ 粒 ^剤 | ピ ^リ ミ ^ス ル ^フ ァ ^ン ・ フェ ^ン ト ^ラ ザ ^ミ ト ^粒 剤 | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウ ^リ カ ^ワ オ ^モ タ ^カ ク ^ロ ク ^ワ イ コ ^ウ キ ^ヤ ガ ^ラ シ ^ズ イ セ ^リ ヒ ^ル ム ^シ ロ ヘ ^ラ オ ^モ タ ^カ ホ ^{タル} イ マ ^ツ バ ^イ ミ ^ズ ガ ^ヤ ツ ^リ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ ル ^レ イ ³ 葉期 但し、移植 後30日まで | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|--|-------------|--|----------|----|----|---------|
| コメット1キロ 粒剤 | テフリルトリオン・ ピラクロニル・メ タゾスルフロ ン 粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/12.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| コメットジヤ ン ホ | テフリルトリオン・ ピラクロニル・メ タゾスルフロ ン 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (300g)/ 10a | 移植後5日 ～1/12.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| コメットフロ ア フル | テフリルトリオン・ ピラクロニル・メ タゾスルフロ ン 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～1/12.5 葉期た だし、移植 後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------|--|----------|--|--------|-------------|
| コメツ顆粒 | テフリルトリオン・ ピラクロニル・メ タゾスルフロ 水和剤 | ウリカワ | 80g/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クロゲワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/2葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| サスケラシ カルシ | カフェンストロー ル・シクロスルファ ムロン・タイムロ ン・ベンゾピ シクロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植後3日 ～1/2葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水口施 用又は 水田に 小包装 (パッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | 水田 に小 包装 (パッ ク)の まま 投げ 入れ る、 のみ とす る。 | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロゲワイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | 移植後3日 ～1/2葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 水口施 用、湛 水散 布又 は無 人航 空機 によ る散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| サスケ粒剤 200 | カフェンストロー ル・シクロスルファ ムロン・タイムロ ン・ベンゾピ シクロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 200g/10 a | 移植後3日 ～1/2葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水口施 用、湛 水散 布又 は無 人航 空機 によ る散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|---|----|---------|
| サラブレッド KAI140粒 剤 | イマゾスルフロ ン・オキサジ ン・ピラコ ニル粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シズイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ /E2.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| サラブレッド KAI400FG | イマゾスルフロ ン・オキサジ ン・ピラコ ニル粒剤 | ウリカワ | 400g/10 a | 移植直後～ /E2.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| サラブレッド KAIジヤ ン ホ | イマゾスルフロ ン・オキサジ ン・ピラコ ニル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植直後～ /E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|----|----|---------|
| サラフレット KAI707 フル | イマゾスルホン・オキサジメトン・ピラコニル水和剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/12.5葉期ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| ジェイソウル1 キロ粒剤 | シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤスカグサ オモダカ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ 1/12.5葉期ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| | | アオミドロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ エゾノサヤスカグサ オモダカ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|--|--|---|----|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--|----|---|--|------------------------|---|---|
| ジエイワル ジヤンボ | シクロピリメト トピラゾラテ トフェントラザ ミド粒剤 | アミトロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (450g)/ 10a | 移植後1日 ～1/2.5 葉期た だし、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤヌカグサ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジエイワル ロアフル | | | | | | | | | シクロピリメト トピラゾラテ トフェントラザ ミド水和剤 | アミトロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エゾノサヤヌカグサ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | アミトロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ 1/2.5葉 期た だし、 移植後30日 まで | | 原液湛 水散布 、水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | | | | | | | | | | | |
| | | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エゾノサヤヌカグサ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | シスイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジエイレン ト1キロ粒 剤 | オキサジクロメホ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル粒剤 | | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | | I | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ウリカワ | | | 移植直後～ 1/3葉期 た だし、 移植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | | | | | | | | | | オモダカ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | クロクワイ | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|------------------------|---|---------|---------------------------------------|--|-----------------|---|----------|---|--------|-------------|
| ジエイフレ ト400FG | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル 粒剤 | ウリカワ | 400g/10 a | 移植後5日 ～レ ¹ I3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| ジエイフレ トジャンボ | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～レ ¹ I3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ジエイフレ トフロアフル | オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～レ ¹ I3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散 布又 は水 口施 用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ジャンタルム MX1キロ粒 剤 | ピリフタリド・ ピリミスルファ ン・メソトリオン 粒剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散 布機 で施 用 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ジャンタルム MXジャンボ | ピリフタリド・ ピリミスルファ ン・メソトリオン 剤 | 一年生雑草 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植後3日 ～レ ¹ I3.5 葉期 だ だし、移 植後 30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ジャンタルム MX豆つぶ 250 | ピリフタリド・ ピリミスルファ ン・メソトリオン 剤 | 一年生雑草 | 250g/10 a | 移植後3日 ～レ ¹ I3.5 葉期 だ だし、移 植後 30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|-------------|---|----------|------------------------------|----|---------|
| シュナイデン 1キロ粒剤 | ビラゾレート・ ペンゾピシ ロン・メタゾスル フロン粒剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | 移植直後～ ビイ2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| シュナイデン ジャンボ | ビラゾレート・ ペンゾピシ ロン・メタゾスル フロン粒剤 | 一年生雑草 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後3日 ～ビイ2.5 葉期 だ だし、移 植後30 日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| シュナイデン プロアール | ビラゾレート・ ペンゾピシ ロン・メタゾスル フロン水和剤 | 一年生雑草 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～ビイ2.5 葉期 だ だし、移 植後30 日まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| シリウスエ クサ1キロ粒 剤 | オキサジクロメ ン・ピラクロ ル・ビラゾスル フロンエチル・ペ ンゾピシロン 粒剤 | アミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミドロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ビイ2.5葉 期 だ だし、移 植後30日 まで | | | | | | |
| | | ウリカ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---------------|--|------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|----------|----|--------|-------------|
| シリウスエカ ザンボ | オキサジクロメ ソニピラクロニ ルピラゾスル フロンエチル・ヘ ンソピシクロン 粒剤 | アミトロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a | 移植直後～ L1E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | シリウスエカ ザフロアブル | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| シリウスエカ ザ顆粒 | オキサジクロメ ソニピラクロニ ルピラゾスル フロンエチル・ヘ ンソピシクロン 水和剤 | ウリカワ | 80g/10a | 移植直後～ L1E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----------------|--|----------|----|--------|-------------|
| ゼータジャ ガ-1粒 剤 | フェンキトリオ ン・フロピリス ルフロン・ペン トキサゾン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ 1/4葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散 布 | | | | |
| ゼータジャ ガ-ジヤ ン ホ | フェンキトリオ ン・フロピリス ルフロン・ペン トキサゾン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (200g)/ 10a | 移植後3日 ～1/4葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータジャ ガ-フロア ブル | フェンキトリオ ン・フロピリス ルフロン・ペン トキサゾン水和 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～1/4葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------------|--|------------------|--|---|-----------------|---|----------|---|--------|-------------|
| ゼータイ ガ-1キ粒 剤 | ブ°ロピ°リスル フ°ロン°ブ°ロモフ° チト°°ヘ°ントキ サゾ°ン粒剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾ°ノヤヌカ°サ | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ°ラ | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ル°I3葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾ°ノヤヌカ°サ | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ°ラ | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータイ ガ-300FG | ブ°ロピ°リスル フ°ロン°ブ°ロモフ° チト°°ヘ°ントキ サゾ°ン粒剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 300g/10 a | 移植後3日 ～ル°I3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | エゾ°ノヤヌカ°サ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ゼータイ ガ-ジ°ヤ ン ホ° | ブ°ロピ°リスル フ°ロン°ブ°ロモフ° チト°°ヘ°ントキ サゾ°ン粒剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 小包装 (ハ°ッ ク)10個 (300g)/ 10a | 移植後3日 ～ル°I3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (ハ°ッ ク)のま ま投げ 入れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾ°ノヤヌカ°サ | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガ°ラ | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|-------------|---|----------|----------------------------------|--------|-------------|---------|------|-------|----------|---------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------|
| ゼータイ ガ-70ア ル | ブ°ロビ°リスル ロン°ブ°ロモブ° チド°ヘ°ントキ ザン水和 剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ~レ°E3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | エゾ°ノヤヌカ°サ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤ°カラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シズ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゼータハンマ ー1粒剤 | ブ°ロビ°リスル ロン°ヘ°ントキ ザン粒剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤ°カラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シズ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | | ウリカワ | オモタ°カ | クロク°ワイ | コウキヤ°カラ | シズ°イ | セリ | ヒルムシロ | ヘラオモタ°カ | ホタルイ | マツバ°イ | ミス°ガ°ヤツリ | 水田一年生雑草 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 移植直後~ レ°E3葉期 ただし、移 植後30日 まで | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | 湛水 散布 のみ とす る。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ウリカワ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | オモタ°カ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | クロク°ワイ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | コウキヤ°カラ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シズ°イ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | セリ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ヒルムシロ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ヘラオモタ°カ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ホタルイ |
| マツバ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゼータハンマ ージ°ヤンホ° | ブ°ロビ°リスル ロン°ヘ°ントキ ザン粒剤 | アミト°ロ°藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植後3日 ~レ°E3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤ°カラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シズ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ°イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミス°ガ°ヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|-------------|---|----------|------------------------------|--------|-------------|
| ゼータハンマー フロアブル | フ・ロピリスル ロン・ベントキ ゾン水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レビ I3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータプラス 1キロ粒剤 | フェンキトリオ ン・フ・ロピリス ルフロノ粒剤 | イゾノヤヌカグサ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | イゾノヤヌカグサ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | |
| ゼータプラス ジャンボ | フェンキトリオ ン・フ・ロピリス ルフロノ粒剤 | イゾノヤヌカグサ | 小包装 (ハッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植後3日 ～レビ I3.5 葉期ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (ハッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ゼータプラス フロアブル | フェンキトリオ ン・フ・ロピリス ルフロノ水和 剤 | イゾノヤヌカグサ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レビ I3.5 葉期 だ だし、移植後 30日まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|----------------------------------|----|---------|
| ゼータワンキ ロ粒剤 | プロピリスル ロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバ イ ミズガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ 1/13葉期 ただし、収 穫60日前ま で | | 湛水散 布 | | | | |
| ゼータワン ジャンボ | プロピリスル ロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～1/13葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバ イ ミズガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータワンフ ロアブル | プロピリスル ロン水和剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～1/13葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 2回以 内 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|--|---|---------------------------------------|--|-------------|---|----------|------------------------------|----|---------|
| ダブスター SB顆粒 | ピラゾスフロ ンエチル・フェン ラザミド・ベン ゾピシクロン 水和剤 | アミトロ・藻類による表層はく離 | 80g/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ 1/12.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| タンクショット フロアブル | カフェンストロ ール・フルピラウ キシフェン ジル・ベンゾ ピシクロン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～1/13葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | エゾノサヤナカサ オモダカ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| タンホース1 キロ粒剤 | カフェンストロ ール・カルフェントラ ゾンエチル・フル | アミトロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 1kg/10a | 移植後5日 ～1/14葉 期 但し収 | 1回 | 湛水散 布 | | | 普 | I |
| タンホース ジャンボ | カフェンストロ ール・カルフェントラ ゾンエチル・フル セットスフロ ンベンゾピシ クロン粒剤 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a | 移植後5日 ～1/14葉 期 但し収 穫60日前 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|--------------------------------------|----|---------|
| タンボハワー 1和粒剤 | ビラコニル・フルセトスルフロ ン・メトリアン粒 剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| タンボハワー 1和粒剤 | ビラコニル・フルセトスルフロ ン・メトリアン粒 剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植直後～ レI3.5葉 期 但し収 穫60日前ま で | 1回 | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと す。 | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| タンボハワー ジャンボ | ビラコニル・フルセトスルフロ ン・メトリアン粒 剤 | アミト・藻類による表層はく離 エゾノサヤヌカグサ 一年生雑草及び多年生広葉雑 草 | 小包装 (パック) 10個 (500g) /10a | 移植後1日 ～レI3.5 葉期但し収 穫60日前ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| ツルギ250 粒剤 | イフフェンカル バゾン・イマ ゾスルフロ ン・ベンゾピシ ロン粒剤 | 一年生雑草 | 250g/10 a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ツルギ250 粒剤 | イフフェンカル バゾン・イマ ゾスルフロ ン・ベンゾピシ ロン粒剤 | 一年生雑草 | 250g/10 a | 移植直後～ レI2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布 | | 湛水 散布、 湛水周 縁散布 のみと す。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ツルギジャン ボ | イフフェンカル バゾン・イマ ゾスルフロ ン・ベンゾピシ ロン粒剤 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 小包装 (パック) 10個 (250g)/ 10a | 移植直後～ レI2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|--|--|---|---|--|-------------|---|----------|------------------------------|----|---------|
| ツルギフロア ブル | イブ [®] フェンカル パ [®] ゾン・イマ ゾ [®] スルフロ ン・メタゾ [®] ピシ ロン水和剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑 草 | 500m ² ル /10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | 原液 湛水 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | | | 移植直後～ ル [®] E2.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | | | |
| デ [®] イオーレ キ ロ粒剤 | オキサジ [®] クロメ ン・テフリルトリ オン・メタゾ [®] スル フロ粒剤 | ウリカワ オモタ [®] カ クロク [®] ワイ コウキヤガ [®] ラ セリ ヒルムシロ ヘラオモタ [®] カ ホタルイ マツバ [®] イ ミス [®] ガヤツリ 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | 湛水 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | | | 移植直後～ ル [®] E3葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | |
| デ [®] イオーレ ジヤンホ [®] | オキサジ [®] クロメ ン・テフリルトリ オン・メタゾ [®] スル フロ粒剤 | ウリカワ オモタ [®] カ クロク [®] ワイ コウキヤガ [®] ラ セリ ヒルムシロ ヘラオモタ [®] カ ホタルイ マツバ [®] イ ミス [®] ガヤツリ 一年生雑草 | 小包装 (パッ ク) 10個 (400g) /10a | 移植後3日 ～ル [®] E3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | |
| デ [®] イオーレ フロ アブル | オキサジ [®] クロメ ン・テフリルトリ オン・メタゾ [®] スル フロ水和剤 | ウリカワ オモタ [®] カ クロク [®] ワイ コウキヤガ [®] ラ セリ ヒルムシロ ヘラオモタ [®] カ ホタルイ マツバ [®] イ ミス [®] ガヤツリ 一年生雑草 | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～ル [®] E3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 | | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|---|----------------|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|---|----|---------|
| デルタアタック 1キロ粒剤 | イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラク ニル・プロモフ チド粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ /E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| デルタアタック ジヤンホ | イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラク ニル・プロモフ チド粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植直後～ /E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|--------------|--|-------------|--|------------|---|--------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----|--|------------|--|---|---|
| トップガン GT1キロ粒 剤51 | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ベン スルフロメチル ペントキサゾン 粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | 砂壤土～ 埴土 | | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | | 移植直後～ レ13葉期 但し、移植 後30日まで | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トップガン L250グラム | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ベン スルフロメチル ペントキサゾン 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植直後～ レ12.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | 砂壤土～ 埴土 | 湛水 散布 又は 湛水 周縁 散布 のみと す。 | 普 | I | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トップガン ジャンボ | | | | | | | | | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ベン スルフロメチル ペントキサゾン 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (近畿・中国・四国、九州) | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植後3日 ～レ12.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | 砂壤土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | | | | | | | | | | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | セリ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ホタルイ | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----|--------|-------------|
| トップガン フロアブル | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ベン スルホンメチル ヘントキサゾン 水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ /E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 原液湛 水散布 | | | | |
| トップガン R1キョ粒剤 | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ベン スルホンメチル ヘントキサゾン 粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布 機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ /E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 湛水散 布 | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|--|--------|-------------|---|------------------|---------------|
| トップガンR ジャンボ | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ペン スルフロメチル ペントキサゾン 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植直後～ L ¹ E2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | トップガンR フロアブル | | | | | | | | | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ペン スルフロメチル ペントキサゾン 水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a |
| ウリカワ | | | | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| クログワイ | | | | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ L ¹ E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 原液湛 水散布 | | | 普 | | I | |
| | | | ウリカワ | | | | | | | | | | |
| | | | オモダカ | | | | | | | | | | |
| | | | クログワイ | | | | | | | | | | |
| | | | シスイ | | | | | | | | | | |
| | | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| | | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| | | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | | マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| トップガンR 豆つぶ 250 | ピリミノパック メチル・プロモ ブチド・ペン スルフロメチル ペントキサゾン 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植直後～ L ¹ E2.5葉 期但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと す。 | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|---|----|---------|
| ナギナト和 粒剤 | オキサジクロ ン・ピリミル ファン・ベンゾ ピシクロン粒 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | 移植直後～ レ ¹ 2.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ナギナトヤ ンホ | オキサジクロ ン・ピリミル ファン・ベンゾ ピシクロン剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植直後～ レ ¹ 2.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカク | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ナギナト豆 つぶ250 | オキサジクロ ン・ピリミル ファン・ベンゾ ピシクロン剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植直後～ レ ¹ 2.5葉 期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカク | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキカガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--|-------------|---|----------|---------------------------------------|----|---------|
| ハッチリキ 粒剤 | イマゾスルフロ ン・ピラクロニ ル・プロモプチ ト粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ ハ イ2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | | | |
| ハッチリ 400FG | イマゾスルフロ ン・ピラクロニ ル・プロモプチ ト粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 400g/10 a | 移植直後～ ハ イ2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁散 布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|-------------------------|----------|-------------------|----|---------|
| パッチリLX1 粒剤 | イマゾスルホン・オキサジクロン・ピラクロニル・フロモフチド粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ L1E2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで | | | | | | |
| パッチリLX400FG | イマゾスルホン・オキサジクロン・ピラクロニル・フロモフチド粒剤 | 一年生雑草 | 400g/10a | 移植直後～ L1E2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布、湛水周縁散布のみとする。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| パッチリLXジャンボ | イマゾスルホン・オキサジクロン・ピラクロニル・フロモフチド粒剤 | ウリカワ | 小包装（パック）10個（400g）/10a | 移植直後～ L1E2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------|---|------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------|----|--------|-------------|
| ハッチリXフ ロアブル | イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・フロモフチ ト水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 移植直後～ /E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | 原液 湛水 散布 のみと する。 | | | | |
| | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハッチリシヤ ンホ | イマゾスルフロ ン・ピラクロニ ル・フロモフチ ト粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (ハッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植直後～ /E2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (ハッ ク)の まま投 げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|----------------|--|--------|-------------|
| パッチプロ フル | イマゾスル フロン・ピ ラクロニ ル・フロモ チト水和剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アミト・藻類による表層はく離 | 移植直後～ ルE2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| パットフル ジャンボ | オキサジ ン・クロメ ロン・ピ リミノ パックメ チル・ベ ンシルフ ロンメ チル剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植後1日 ～ルE2.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ入 れる。 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | クロクワイ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| パットフル E-250グラ ム | オキサジ ン・クロメ ロン・ピ リミノ パックメ チル・ベ ンシルフ ロンメ チル剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植後1日 ～ルE2.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人ヘリ コプター による散 布 | 砂壤 土～ 埴土 | 湛水 散布 又は 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | (北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|---|----|---------|
| ビクトリーZ1 粒剤 | ビラクロル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤナカサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ L13葉期 ただし、収 穫60日前ま で | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | 湛水 散布の みとす る。 | | |
| ビクトリー Z400FG | ビラクロル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 400g/10 a | 移植後5日 ～L13葉 期ただし、 収穫60日前 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ビクトリーZ ジャンボ | ビラクロル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～L13葉 期ただし、 収穫60日前 まで | 2回以 内 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ビクトリーZ ロアフル | ビラクロル・ プロピリスル ロン水和剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～L13葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人ヘリ コプターに よる滴 下 | | 原液 湛水 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤナカサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミズガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--|--|
| ビシット粒 剤17 | シハロップ [®] フ ル・テニルコロ ル・ペンシルフ ンメチル粒剤 | ウリカワ | 3kg/10a | 移植後5日 ～/ビ [®] I3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| フルインク ジャンボ [®] | カフェンスト ール・カルフェ ントラ ゾ [®] ンエチル・フ ルセトスルフロ ンペンゾ [®] ビシ クロン粒剤 | 一年生雑草 | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植後5日 ～/ビ [®] I4葉 期 但し収 穫60日前ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| フルスコアZ1キ ロ粒剤 | ブ [®] ロビ [®] リスル フロン・ランコ トリオンナトリ ウム塩 粒剤 | アミト [®] ロ [®] 藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植後5日 ～/ビ [®] I3.5 葉期但し収 穫60日前ま で | 1回 | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I | | | |
| | | エゾノヤヌカ [®] サ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| フルスコアZ ジャンボ [®] | ブ [®] ロビ [®] リスル フロン・ランコ トリオンナトリ ウム塩 粒剤 | アミト [®] ロ [®] 藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (300g)/ 10a | 移植後5日 ～/ビ [®] I3.5 葉期但し収 穫60日前ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | エゾノヤヌカ [®] サ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| フルセータ 1キロ粒剤 | ブ [®] ロビ [®] リスル フロン・ペンソ ビシクロン粒 剤 | アミト [®] ロ [®] 藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | |
| | | エゾノヤヌカ [®] サ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アミト [®] ロ [®] 藻類による表層はく離 | | 移植直後～ /ビ [®] I3葉期 ただし、収 穫60日前ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | | | | エゾノヤヌカ [®] サ | | | | | | | | |
| | | | | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | | | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| フルセータ ジャンボ [®] | ブ [®] ロビ [®] リスル フロン・ペンソ ビシクロン粒 剤 | アミト [®] ロ [®] 藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植後5日 ～/ビ [®] I3葉 期 ただし、 収穫60日前 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | |
| | | エゾノヤヌカ [®] サ | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---|--|---|---|---|-------------|---|----------|------------------------------|--------|-------------|
| フルベータ ロアフル | ブ ^ロ ピ ^リ スル フ ^ロ ン [・] ベン ^ゾ ピ ^シ クロ ^ン 水 和 ^剤 | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～ ^レ ビ [・] 13葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | エ ^ノ ノサ ^ヤ カ ^ク サ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| フルハ ^ワ ー MX1 ^キ 粒 剤 | ピ ^ラ クロ ^ニ ル [・] フ ルセ ^ト スル ^フ ロ ^ン メ ^ト リ ^オ ン ^粒 剤 | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウ ^リ カ ^ク | | | | | | | | |
| | | エ ^ノ ノサ ^ヤ カ ^ク サ | | | | | | | | |
| | | オ ^モ タ ^カ | | | | | | | | |
| | | ク ^ロ ク [・] ウ ^イ | | | | | | | | |
| | | コ ^ウ キ ^ヤ カ ^ラ | | | | | | | | |
| | | シ ^ス ・ ^イ | | | | | | | | |
| | | セ ^リ | | | | | | | | |
| | | ヒ ^ル ム ^シ ロ | | | | | | | | |
| | | ヘ ^ラ オ ^モ タ ^カ | | | | | | | | |
| | | ホ ^ト ル ^イ | | | | | | | | |
| | | マ ^ツ バ ^イ | | | | | | | | |
| | | ミ ^ズ カ [・] ヤ ^ツ リ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ^レ ビ [・] 13.5葉 期 但し収 穫60日前 まで | 1回 | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | ウ ^リ カ ^ク | | | | | | | | |
| | | エ ^ノ ノサ ^ヤ カ ^ク サ | | | | | | | | |
| | | オ ^モ タ ^カ | | | | | | | | |
| | | ク ^ロ ク [・] ウ ^イ | | | | | | | | |
| | | コ ^ウ キ ^ヤ カ ^ラ | | | | | | | | |
| | | シ ^ス ・ ^イ | | | | | | | | |
| | | セ ^リ | | | | | | | | |
| | | ヒ ^ル ム ^シ ロ | | | | | | | | |
| | | ヘ ^ラ オ ^モ タ ^カ | | | | | | | | |
| ホ ^ト ル ^イ | | | | | | | | | | |
| マ ^ツ バ ^イ | | | | | | | | | | |
| ミ ^ズ カ [・] ヤ ^ツ リ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| フルハ ^ワ ーMX シ ^ン ボ [・] | ピ ^ラ クロ ^ニ ル [・] フ ルセ ^ト スル ^フ ロ ^ン メ ^ト リ ^オ ン ^粒 剤 | ア ^ミ ト ^ロ ・藻類による表層はく離 | 小包装 (^パ ッ ク) 10個 (500g) /10a | 移植後1日 ～ ^レ ビ [・] 13.5 葉期但し収 穫60日前 まで | 1回 | 水田に 小包装 (^パ ッ ク)の まま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | エ ^ノ ノサ ^ヤ カ ^ク サ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草及び多年生広葉雑 草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|----------|----|--------|-------------|
| ヘルガ1キ ロ粒剤 | ピリミノパック メチル・フェキノ トリオン粒剤 | アミト・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ オモタカ コウキカガラ セリ ヒルムシロ ヘラオモタカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | 移植直後～ ヒ・E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 湛水散 布 | | | | |
| ヘルガ ジャンボ | ピリミノパック メチル・フェキノ トリオン剤 | ウリカワ | 小包装 (パック) 10個 (250g)/ 10a | 移植直後～ ヒ・E3葉期 但し、移植 後30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモタカ セリ ヒルムシロ ヘラオモタカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ヘルガフロ アフル | ピリミノパック メチル・フェキノ トリオン水和 剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤヌカグサ オモタカ セリ ヒルムシロ ヘラオモタカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 移植直後～ ヒ・E3葉期 但し、移植 後30日まで | | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|----------------|---|----|---------|
| ベルガ豆 つぶ250 | ピリミノパック メチル・フェンキ トリオン剤 | ウリカワ | 250g/10 a | 移植直後～ ⅮⅠ3葉期 但し、収穫 75日前まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| ペンケイ1キ 粒剤 | ピリミスルファ ン・フェノキサ ルホン・ベンゾ ビシクロン粒 剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | 移植直後～ ⅮⅠ3葉期 但し、移植 後30日まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ペンケイ ンボ | ピリミスルファ ン・フェノキサ ルホン・ベンゾ ビシクロン剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (250g)/ 10a | 移植後3日 ～ⅮⅠ3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ペンケイ豆 つぶ250 | ピリミスルファ ン・フェノキサ ルホン・ベンゾ ビシクロン剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植後3日 ～ⅮⅠ3葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ホクト1キ 粒剤 | シハロホップフ チル・ジメタト リン・ピラゾス ルフロニエチル プレチラコ ル粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植後5日 ～ⅮⅠ3葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(近畿・中国・四国の早期、 九州を除く) | | | | | | | | |
| | | クワヅイ(北海道、近畿・中国・四 国の早期、九州を除く) | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| ホットコン 200粒剤 | テニクロール・ ペンゾビシク ロン粒剤 | ヒルムシロ | 200g/10 a | 移植直後～ ⅮⅠ2葉期 ただし、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布 | | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-----------------|--|----------|----|--------|-------------|--|----|---|--|------------------------|
| ホットコンビ ジャンボ | テルクロル・ ベンゾピシ ロン粒剤 | ヒルムシロ | 小包装 (ハッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植直後～ /ヒ°E2葉期 ただし、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (ハッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| ホ°テ°ガ°ー ト°1キ0粒 剤 | テフリトリオン・ フェントラザ°ミ ト°粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | | | |
| | | エゾノサヤヌカ°サ | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキカ°ラ | | | | | | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | 移植直後～ /ヒ°E3葉期 ただし、移 植後30日ま で | 1回 | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 |
| | | エゾノサヤヌカ°サ | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキカ°ラ | | | | | | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ°テ°ガ°ー ト°ジャンボ | テフリトリオン・ フェントラザ°ミ ト°粒剤 | ウリカワ | 小包装 (ハッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～/ヒ°E2.5 葉期 だ だし、移 植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (ハッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I | | | | | |
| | | エゾノサヤヌカ°サ | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロク°ワイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキカ°ラ | | | | | | | | | | | | | |
| | | シス°イ | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタ°カ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------------|---------------------------|----------|---------------|--|-------------|---|----------|------------------------------|--------|-------------|
| ホテ-ガード トフロキ 粒剤 | テフリトリオン トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | エゾノヤヌカクサ | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| キシュウスメノヒエ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植直後～ 1/13.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布の みとす る。 | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| エゾノヤヌカクサ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| キシュウスメノヒエ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ホテ-ガード トフロアブル | テフリトリオン フェトラザミ ト水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～1/13葉 期 ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 又は無 人ヘリコ プターに よる滴下 | | 原液 湛水 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | エゾノヤヌカクサ | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| シスイ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ホテ-ガード トフロシヤ ンボ | テフリトリオン トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| キシュウスメノヒエ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| ポテターゴ トフロア ブル | テフリトリオン・ トリアファモン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～レ ¹ E3.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | キシュウス ^メ /ヒエ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ポテターゴ ト豆つぶ 250 | テフリトリオン・ フェントラザミ ト剤 | アオイトロ・藻類による表層はく離 | 250g/10 a | 移植後5日 ～レ ¹ E2.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人ヘリ コプター による散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁散 布のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤカクサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| マサカリジヤ ンホ | インタノファン・ クロメフロッ プ・ベンスルフ ロンメチル粒剤 | アオイトロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植後5日 ～レ ¹ E2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ入 れる。 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ(九州を除く) | | | | | | | | |
| | | クロクワイ(北陸、九州を除く) | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | マストラキ 1キ 粒剤 | | | | | | | | |
| エゾノサヤカクサ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | |
| アオイトロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | | | |
| エゾノサヤカクサ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | |
| マストラジヤ ンホ | イマゾスルフォ ン・ヒリミノ バックメチル・ フェンキトリオン 粒剤 | アオイトロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (200g)/ 10a | 移植直後～ レ ¹ E3葉期 ただし、移 植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤカクサ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草及び多年生広葉雑 草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|-------------|---|----------|--------------------------|----|---------|-----|------------------------|---------------|--|--|--|
| マストラフロ ブル | イマゾスル フロン・ピ リノハクメ チル・フェ ンキトリ オン水和 剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | 原液湛 水散布 のみと する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | エゾノヤブカグサ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | 移植直後～ L13葉期 ただし、移 植後30日 まで | | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | エゾノヤブカグサ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスター・ホ ムラン1キ ロ粒剤51 | オキサジ ン・クロ マプロ ップ・ヘ ンシル ロメチル 粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (北陸を除く) | 1kg/10a | 移植後5日 ～L12.5 葉期 但し、 移植後30日 まで | 1回 | 湛水散 布又は 無人ヘ リコプ ターに よる散 布 | 砂壤 土 | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I | | | | | | |
| | | ウリカ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | 移植時 | 田植同 時散布 機で施 用 | 壤土 ～埴 土 | | | |
| | | クログワイ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (北陸を除く) | | 移植直後～ L12.5葉 期 但し、移 植後30日 まで | | 湛水散 布又は 無人ヘ リコプ ターに よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | | | | | | | |
| | | ウリカ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|----|--------|-------------|---|---|----------------------------------|
| ミスターホームラ ンジヤンボ | オキサジクロホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 (北陸、九州を除く) | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植後3日 ～12葉 期 但し、移 植後30日ま で | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | 壤土 ～埴 土 | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ(北陸を除く) | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ミスターホームラ ンフロアブル | オキサジクロホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | 砂壤 土～ 埴土 | | 普 | I | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | | 移植直後～ 12.5葉 期 但し、移 植後30日ま で | 原液湛 水散布 又は無 人ヘリコ プターに よる滴下 | 原液 湛水 散布 のみ とす る。 |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツバ イ | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------|--|----------|---|----|---------|
| メガセータ 1 粒剤 | ピラクロニル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ル・I3葉期 ただし、収 穫60日前ま で | | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クロクワイ コウキヤガラ シスイ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| メガセータ 400FG | ピラクロニル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 400g/10 a | 移植後5日 ～ル・I3葉 期ただし、 収穫60日前 まで | 1回 | 湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布、 湛水 周縁 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| メガセータ ジャンボ | ピラクロニル・ プロピリスル ロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～ル・I3葉 期ただし、 収穫60日前 まで | 2回以 内 | 水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| メガセータ ロアフル | ピラクロニル・ プロピリスル ロン水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～ル・I3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人ヘリ コプターに よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤヌカグサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|------------------------------|----|---------|
| モーレツ1キ 粒剤 | ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン・ベンフル セート粒剤 | エゾノヤヌカグサ | 1kg/10a | 移植後5日 ～/ピI2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| モーレツジヤ ンホ | ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン・ベンフル セート粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～/ピI2.5 葉期ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ 入れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| モーレツフロ アブル | ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン・ベンフル セート水和剤 | エゾノヤヌカグサ | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～/ピI2.5 葉期ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ライジンパ ワー1キ粒 剤 | インタノファン・ ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン粒剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後3日 ～/ピI2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ライジンパ ワージヤン ホ | インタノファン・ ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a | 移植後3日 ～/ピI2.5 葉期ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投げ 入れる。 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ライジンパ ワーフロア ブル | インタノファン・ ピラクロニル・ ペンゾピシ ロン水和剤 | エゾノヤヌカグサ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～/ピI2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで | 1回 | 原液湛 水散布 又は水 口施用 | | 原液 湛水 散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-----------------|--|----------|----|--------|---------------|---|----|------------|--|---|---|------------------------|
| 銀河1号 粒剤 | ダ [®] イムロン [®] ・ヒ ラクロニル [®] ・メタ ゾ [®] スルフロ [®] 粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | | 普 | I | | | | | | | |
| | | オモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロク [®] ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガ [®] ラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シズ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | 移植直後～ ヒ [®] I3葉期 ただし、収 穫60日前ま で | 湛水散 布又は 無人ヘリ コプターに よる散 布 | | 湛水 散布 のみと する。 | | | | | | | | | | | | | |
| オモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロク [®] ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガ [®] ラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シズ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀河ジヤ ンホ [®] | ダ [®] イムロン [®] ・ヒ ラクロニル [®] ・メタ ゾ [®] スルフロ [®] 粒 剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後5日 ～ヒ [®] I3葉 期ただし、 収穫60日前 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロク [®] ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガ [®] ラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シズ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀河フロ アブル | ダ [®] イムロン [®] ・ヒ ラクロニル [®] ・メタ ゾ [®] スルフロ [®] 水 和剤 | ウリカワ | | | | | | | | 500mL/1 0a | 移植後5日 ～ヒ [®] I3葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 | | 普 | I | |
| | | オモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロク [®] ワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コウキヤガ [®] ラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シズ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダ [®] カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツバ [®] イ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミス [®] ガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天空1号 粒剤 | フェントラザ [®] ミ ト [®] ・ベンゾ [®] ピシクロ [®] ・メタ ゾ [®] スルフロ [®] 粒 剤 | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同 時散布 機で施 用 | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミト [®] ・藻類による表層はく離 | | 移植直後～ ヒ [®] I3葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布 | | | | | | | | | | | 湛水 散布 のみと する。 |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|---------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------|---|----------|--------------|----|---------|
| 天空ジャンボ | フェントラサミド・ベンゾピシロン・メタゾスルホン粒剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 小包装（パック）10個（300g）/10a | 移植後1日～1/2葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| 天空707フル | フェントラサミド・ベンゾピシロン・メタゾスルホン水和剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 500mL/10a | 移植時 移植直後～1/2葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 田植同時散布機で施用 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | | 原液湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| 忍1和粒剤 | イマゾスルホン・ピラクロニル・ベンゾピシロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 イゾノヤヌカガサ 一年生雑草 多年生広葉雑草 アミト・ロ・藻類による表層はく離 イゾノヤヌカガサ 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 1kg/10a | 移植時 移植直後～1/2葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 田植同時散布機で施用 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| 忍ジャンボ | イマゾスルホン・ピラクロニル・ベンゾピシロン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 小包装（パック）10個（200g）/10a | 移植直後～1/2葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| 忍707フル | イマゾスルホン・ピラクロニル・ベンゾピシロン水和剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 イゾノヤヌカガサ 一年生雑草 多年生広葉雑草 アミト・ロ・藻類による表層はく離 イゾノヤヌカガサ 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 500mL/10a | 移植時 移植直後～1/2葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 田植同時散布機で施用 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | | 原液湛水散布のみとする。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用 土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|----------|----------------------------|----|---------|
| 半蔵1キロ 粒剤 | シロスルファミン・ベンゾピシロン・ペントキサゾン粒剤 | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | 移植直後～ レ ¹ 1.5葉 期ただし、 移植後30日 まで | | 湛水散布 | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | アミト・ロ・藻類による表層はく離 | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | |
| 流星1キロ 粒剤 | フェンキトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | 移植直後～ レ ¹ 3葉期 ただし、移 植後30日ま で | | 湛水散布 又は 無人航 空機に よる散 布 | | 湛水 散布 のみ とす る。 | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 流星ジャン ボ | フェンキトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a | 移植後3日 ～レ ¹ 13葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 水田に 小包装 (パッ ク) のまま 投げ入 れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 流星フロア ブル | フェンキトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 移植後3日 ～レ ¹ 13葉 期ただし、 移植後30日 まで | 1回 | 原液湛 水散布 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

②移植用 体系処理剤（初期）

※薬剤によっては、田植え前に使用できる初期剤があるが、本県では田植え前には使用しないように指導する。

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------|-------------------------|----|---------|
| アルパーフフロアブル | テニクロール水和剤 | マツハイ | 500mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | 水田一年生雑草 | | 植代後～移植 前7日または移 植直後～ ^レ 1 葉期 ただし、 移植後30日ま で | | 原液湛水 散布 | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| エリジヤンEW乳剤 | フレチクロール乳剤 | ハラモダカ | 100mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | 湛水散 布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | 移植直後～ ^レ 1葉期 ただ し、移植後30日 まで | | 湛水散布、 水口施用 又は無人 航空機に よる滴下 | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| エリジヤンホ | フレチクロール粒剤 | ハラモダカ | 小包装 (ハッ ク)10個 (300g) /10a | 植代後～移植 前7日又は移植 直後～ ^レ 1葉 期 ただし、移 植後30日まで | 1回 | 水田に小 包装(ハッ ク)のまま 投げ入れ る。 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| エリジヤン乳剤 | フレチクロール乳剤 | ハラモダカ | 300mL/ 10a | 移植直後～ ^レ 1葉期 ただ し、移植後30日 まで | 1回 | 原液湛水 散布 | | | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| かねつぐり粒剤 | シロスルファミン・フレチクロール粒剤 | アオミドロ・藻類によ りカワ | 1kg/10 a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | 移植直後～ ^レ 1.5葉期 但 し、移植後30日 まで | | 湛水散布 | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アオミドロ・藻類によ りカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------|---|--|--|
| かねつぐーら ジカシジャンボ | シクロルファミロ ン・プレチラクロー ル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (ハッ ク)10個 (300g) /10a | 移植直後～ビ E2葉期 但し、 移植後30日ま で | 1回 | 水田に小 包装(ハッ ク)のまま 投げ入れ る。 | | | 普 | I | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | クワグワイ | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| クラー1粒 剤 | ジメタメリン・ ブタクロール粒 剤 | アオミドロ・藻類によ | 1kg/10 a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アオミドロ・藻類によ | | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～ビE1.5 葉期 ただし、 移植後30日ま で | | 湛水散布 又は無人 航空機に よる散布 | | 移植前 には処 理しな い。湛 水散布 のみと する。 | | |
| | | | | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | | | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | | | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| クラーEW | ジメタメリン・ ブタクロール乳 剤 | アオミドロ・藻類によ | 500mL/ 10a | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～ビE1.5 葉期 但し、移 植後30日まで | 1回 | 原液湛水 散布 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |
| サイヨシフロア ブル | ヘントキサゾン 水和剤 | ホタルイ | 300mL/ 10a | 移植直後～ノ ビE1葉期 た だし、移植後30 日まで | 2回以 内 | 原液湛水 散布 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| | | | | クワグワイ | 500mL/ 10a | 移植時 | | 田植同時 散布機で 施用 | | | | | |
| | | | | コウキカラ | | | | | | | | | |
| | | | | ハラオモダカ | | | | | | | | | |
| | | | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | | | クワグワイ | | | | | | | | | |
| | | | | コウキカラ | | | | | | | | | |
| | | | | ハラオモダカ | | | | | | | | | |
| | | | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | | | マツハイ | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------|--|-------------|---|--|---|----|---------|
| ソルネット1キロ粒剤 | フレチクロール粒剤 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 湛水散布 | 壤土～埴土 | | 普 | I |
| | | マツハイ | | 移植直後～ ^レ ピ ^レ エ1葉期ただし、 移植後30日まで | | | | | | |
| ダッシュワンフロアブル | タイムロン・ペン トキサゾン水和 剤 | クログワイ | 500mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 原液湛水 散布 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | ハラオモダカ | | 植代後～移植 前7日又は移植 直後～ ^レ ピ ^レ エ1葉 期 但し、移植 後30日まで | | | | | | |
| ハデホーブ1キロ粒剤 | タイムロン・フレ チクロール粒剤 | ホタルイ | 1kg/10a | 植代後～移植 前7日又は移植 直後～ ^レ ピ ^レ エ1葉 期 但し、移植 後30日まで | 1回 | 湛水散布 | 砂壤土～ 埴土 | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| パレージ粒剤 | ジメトリン・ フレチクロール 粒剤 | アミドロ・藻類によ | 3kg/10a | 移植後3日～7 日（ ^レ ピ ^レ エの1.5 葉期まで） | 1回 | 湛水散布 | 砂壤土～ 埴土（減 水深2cm/ 日以下）（但 し、近畿・ 中国・四 国・九州 では砂壤 土を除く） | | 普 | I |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| ピラクロン1キロ粒剤 | ピラクロール粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 湛水散布 又は無人ハ リコフターに よる散布 | | 移植前 には処 理しな い。湛 水散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～ ^レ ピ ^レ エ1.5 葉期 但し移 植後30日まで | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------|----|-----|
| ビラクロンジヤンホ | ビラクロニル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (ハッ ク)10個 (300g) /10a | 移植直後～ビ E1.5葉期た だし、移植後30日 まで | 1回 | 水田に小 包装(ハッ ク)のまま 投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ビラクロンフロアブル | ビラクロニル水和剤 | ウリカワ | 500mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～ビE1.5 葉期ただし移 植後30日まで | 原液湛水 散布又は 水口施用 | | 移植前 には処 理しな い。 原液湛 水散布 のみと する。 | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ホットコンビフロアブル | テニクロール・ベンゾヒシロン水和剤 | ヒルムシロ | 300～ 500mL/ 10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | 300mL/ 10a | 植代後～移植 前7日または移 植直後～ビE 1.5葉期 た だし、移植後30日 まで | 原液湛水 散布、水口 施用又は 無人航空 機による 滴下 | | 移植前 には処 理しな い。 原液湛 水散布 のみと する。 | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | 500mL/ 10a | 移植直後～ビ E2葉期 た だし、移植後30日 まで | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| マツタブジヤンホ | クミロン・テニクロール剤 | クロクワイ | 5～10 個(250 ～ 500g)/ 10a | 植代後～移植 前7日又は移植 直後～ビE1葉 期 但し、移植 後30日まで | 1回 | 水田に投 げ入れる。 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---|----------|--|------|---|----|-----|
| メオ1和粒剤 | ヘントキサゾン 粒剤 | クログワイ | 1kg/10a | 移植時 | 2回以内 | 田植同時 散布機で 施用 | | 移植前 には処 理しな い。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| メオジヤンホ | ヘントキサゾン 粒剤 | ホタルイ | 小包装 (パック) 10個 (300g) /10a | 植代後～移植 前7日又は移 植直後～ ^レ 1葉 期 但し、移 植後30日まで | 1回 | 水口施用 又は水田 に小包装 (パック)の まま投げ 入れる。 | | 移植前 には処 理しな い。水 田に小 包装 (パック) のまま 投げ入 れる、 のみと する。 | 普 | I |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| メオフロアブル | ヘントキサゾン 水和剤 | クログワイ | 500mL/ 10a | 移植時 | 2回以 内 | 田植同時 散布機で 施用 | | 移植前 には処 理しな い。原 液湛水 散布の みとす る。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ユニハーフロアブル | フレチクロール・ ベンゾフェナツ プ水和剤 | ウリカワ | 500mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | 原液湛 水散布 のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | ハラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | | | 移植直後～ ^レ 1 葉期 但し、 移植後30日 まで | | 原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下 | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | |
|---------|----------------------|---------|-----------------------|--|---------|------------|------|-------------|----|-----|---------------|
| 草笛ジヤンボ | クミロン・ベントキサゾン剤 | クログワイ | 10個 (500g) /10a | 植代後～移植前7日又は移植直後～ ^レ 11葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 水田に投げ入れる。 | | 移植前には処理しない。 | 普 | I | |
| | | コウキカヲ | | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | 20個 (1kg) /10a | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | 5個 (250g) /10a | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| 草笛フロアブル | クミロン・ベントキサゾン水和剤 | クログワイ | 300mL/ 10a(少量散布) | 移植時 | 1回 | 田植同時散布機で施用 | | 移植前には処理しない。 | 普 | I | |
| | | コウキカヲ | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | 500mL/ 10a |
| | | コウキカヲ | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | |
| | | ハラモダカ | 500mL/ 10a | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ハラモダカ | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | 500mL/ 10a | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ハラモダカ | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | 500mL/ 10a | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ハラモダカ | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | 500mL/ 10a | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |
| ハラモダカ | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農業の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|---------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------|----|----|-----|
| 兆1和粒剤 | ヒ°ラクロニル粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～レ°I1.5 葉期 ただし移 植後30日まで | 湛水散布 又は無人ハ リコプターに よる散布 | | | 移植前 には処 理しな い。湛 水散布 のみと する。 | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 兆ジ°ンボ° | ヒ°ラクロニル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (ハッ ク)10個 (300g) /10a | 移植直後～レ° I1.5葉期た だし、移植後30日 まで | 1回 | 水田に小 包装(ハッ ク)のまま 投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 兆70アブル | ヒ°ラクロニル水和剤 | ウリカワ | 500mL/ 10a | 移植時 | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | 植代後～移植7 日前又は移植 直後～レ°I1.5 葉期ただし移 植後30日まで | 原液湛水 散布又は 水口施用 | | | 移植前 には処 理しな い。原 液湛水 散布の みとす る。 | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| オモダカ | | | | | | | | | | |
| クロクワイ | | | | | | | | | | |
| コウキヤガラ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ハラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

③移植用 体系処理剤（中期・後期）

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|------|------------|----|-----|
| アトラスジャンボMX | アジムスルフロン・ペノキサラム・メトリオン粒剤 | ウリカワ | 小包装(パック)20個(500g)/10a | 移植後14日～ノビE3.5葉期 ただし、収穫45日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | キシュウスズメノヒエ | | | | | | | | |
| | | ククワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤカラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスカヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アトリ1キロ粒剤 | ヒリミスルファン粒剤 | ルビエ | 1kg/10a | 移植後14日(稲5葉期以降)～ルビE4葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| アトリ豆つぶ250 | ヒリミスルファン粒剤 | ルビエ | 250g/10a | 移植後14日(稲5葉期以降)～ルビE4葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| アレイルSC | ハロスルフロメチル・メタゾスルフロ水和剤 | 一年生雑草 | 500mL/10a | 移植後25日～ノビE5葉期 ただし、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は落水散布 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ウイードコア1キロ粒剤 | フロルピラウキシンフェンベンジル・ペノキサラム・ベンゾピシクロン粒剤 | キシュウスズメノヒエ | 1kg/10a | 移植後7日～ルビE4葉期 ただし、収穫60日前まで | 2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| カービー1キロ粒剤 | シハロホップ・チル・ベンゾピシクロン・MCPB粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE3葉期 ただし、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスカヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|-------|----|------------|-----|---------------------------------|----------------|---------|---------------------------|----|------------------|--------------------------|------------|---|---|--|--|--|
| グラスシンM+トリウム粒剤 | ベンタゾン・MCPAエチル粒剤 | ウリカワ | 3～4kg/10a | 有効分けつ終止期～幼穂形成期前(但し収穫60日前まで) | 1回 | 落水散布 | 壤土～埴土 | | 普 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ(北海道、東北、近畿・中国・四国) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草(イネ科を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | 3kg/10a | | | | | | | | | | 砂壤土 | | | | | | | | | | |
| | | セリ(北海道、東北、近畿・中国・四国) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草(イネ科を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クリンチャー1キロ粒剤 | シハロホップブチル粒剤 | アセガヤ | 1.5kg/10a | 移植後25日～ノビE5葉期 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | | | 湛水散布のみとする。 | 普 | | | I | | | | | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アセガヤ | 1kg/10a | | | | | | | | | | | | | | 移植後7日～ノビE4葉期 但し、収穫30日前まで | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クリンチャーEW | シハロホップブチル乳剤 | アセガヤ | 100mL/10a | 移植後20日～ノビE6葉期 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布又は落水散布 | | | 普 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クリンチャージャンボ | シハロホップブチル粒剤 | アセガヤ | 小包装(パック)20個(1kg)/10a | 移植後7日～ノビE4葉期 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アセガヤ | 小包装(パック)30個(1.5kg)/10a | | | | | | | | 移植後25日～ノビE5葉期 但し、収穫30日前まで | | | | | | | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クリンチャーパスメ液剤 | シハロホップブチル・ベンタゾン液剤 | ウリカワ | 1000mL/10a | 移植後15日～ノビE5葉期 但し、収穫50日前まで | 2回以内 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | | | 普 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | キシウスズメノヒエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウキヤガラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ケパード1キロ粒剤 | | | | | | | | | ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン・メゾスルフロン粒剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 1kg/10a | 移植後14日～ノビE4葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------|----------------------|--------|----|----|-----|
| ゲバードジャンホ | ダイロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン・メゾスルフロン粒剤 | 一年生雑草 | 小包装(パック)10個(400g)/10a | 移植後14日～ノビE4葉期ただし、収穫60日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ザーベックスDX1キロ粒剤 | シハロホップ・チル・シメリン・ベンフレレート・MCPB粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く) | 1kg/10a | 移植後20～30日(ノビE3.5葉期まで)[移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用] | 1回 | 湛水散布 | 砂壤土～埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ(東北を除く) | | | | | | | | |
| | | オモダカ(九州の早期を除く) | | | | | | | | |
| | | ククワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ(東北、北陸を除く) | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツパイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道を除く) | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ザーベックスSM1キロ粒剤 | | | | | | | | |
| ウリカワ | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| オモダカ(北陸を除く) | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| ククワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ(北陸を除く) | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| ホタルイ | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| マツパイ | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ(北海道を除く) | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| | 壤土～埴土 | | | | | | | | | |
| | 砂壤土～埴土 | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|----------------------|------|------------|----|-----|
| サンパンチ1キロ粒剤 | シハロホップ・フチル・ジメタメリン・ハロスルフロメチル・ベンゾピシクロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE3.5葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | キシュウスズメノヒエ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| セカントショットSジャンボMX | アジムスルフロム・ペノキスラム・メトリオン粒剤 | ウリカワ | 小包装(パック)20個(500g)/10a | 移植後14日～ノビE3.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | キシュウスズメノヒエ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤカラ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツパイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ニトリユウ1キロ粒剤 | ペノキスラム・ベンゾピシクロン粒剤 | 一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE4葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ニトリユウジャンボ | ペノキスラム・ベンゾピシクロン粒剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 移植後15日～ノビE4葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| ミニ液剤 | ビスピリパックナトリウム塩液剤 | イホクサ | 50～100mL/10a | 移植後30日～イホクサの茎長30cmまで 但し、収穫60日前まで | 1回 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | | | 普 | I |
| | | クサネム | | 移植後30日～クサネムの草丈40cmまで 但し、収穫60日前まで | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|------|------------------------|----|-----|
| ハイカット1キロ粒剤 | シハロホップ・フチル・ジメトリン・ハロスルフロメチル・ベンゾピシクロン粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE3.5葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | キシュウスズメノヒエ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ハイスコープ1キロ粒剤 | シクロピリモレート・テフルトリオン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後14～60日ただし、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布、ごく浅く湛水して散布、のみとする。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | ククワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草(ノヒエを除く) | | | | | | | | |
| ハサケラン液剤(ナトリウム塩) | ベンタゾン液剤 | ウリカワ | 500～700mL/10a | 移植後15～55日 但し 収穫50日前まで | 2回以内 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤヌカグサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クサネム | | | | | | | | |
| | | ククワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤカラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草(イネ科を除く) | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------|----------------------------|------|-------------------|----|-----|
| ハサグラン粒剤(ナトリウム塩) | ベンタゾン粒剤 | ウリカワ | 3~4kg/10a | 移植後15~55日 但し 収穫60日前まで | 1回 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | | | 普 | I |
| | | エゾノサヤヌカゲサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草(イネ科を除く) | | | | | | | | |
| ヒエクリーンイキロ粒剤 | ビリミノバックメチル粒剤 | ヒエ | 1kg/10a | 移植後15日~ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| ヒエクリーンハサグラン粒剤 | ビリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤 | ウリカワ | 3kg/10a | 移植後15日~ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | ごく浅く湛水して散布 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ヒエクリーン豆つぶ250 | ビリミノバックメチル剤 | ヒエ | 250g/10a | 移植後15日~ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布、湛水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布 | | 湛水散布、湛水周縁散布のみとする。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------|------------------------|----|-----|
| フイコール SM1キロ粒剤 | シメリン・ペキ ススラム・ MCPB粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸、近畿・中国・四国) | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE3.5葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布 | 砂壤土～埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ(北陸、近畿・中国・四国) | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ルナクロス1キロ 粒剤 | シクロピリモレー ト・テフリルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後14～60日ただし、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布、ごく浅く湛水して散布、のみとする。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草(ノビEを除く) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| レプラス1キロ 粒剤 | ジメタメリン・ダ イムロン・テフリ ルトリオン・メタソ ルフロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後14日～ノビE4葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤカラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| レプラスジャン ホ | ジメタメリン・ダ イムロン・テフリ ルトリオン・メタソ ルフロン粒剤 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 小包装(パック)10個(400g)/10a | 移植後14日～ノビE4葉期ただし、収穫60日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|---|----------|-----------------------------------|------|--------------------|----|-----|
| ロイヤント乳剤 | フロルピラウキン フェンペンシル 乳剤 | ウリカワ | 200mL/10a | 移植後20日～ノ ビE5葉期 ただ し、収穫45日前 まで | 2回以 内 | 落水散布、ご く浅く湛水し て散布又は 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ノビエ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| | | アセガヤ | | | | | | | | |
| | | エゾノサヤスカグサ | | | | | | | | |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| ワイトアタックD1 キロ粒剤 | ダイヤモンド・ヘ ノキスラム粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後15日～ノ ビE5葉期(稲4葉 期以降)ただし、 収穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散 布のみと する。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | コウキヤカラ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ワイトアタック SC | | | | | | | | |
| 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 備考 | 毒性 | 魚毒性 |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------|--------|------------|----|-----|
| ワイトショット1キロ粒剤 | テフリルトリオン・ヘノキスラム粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後15日～ノビE4葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | シスイ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ワイトパワー粒剤 | ヘノキスラム・ヘンタゾン粒剤 | ウリカワ | 3kg/10a | 移植後20日～ノビE5葉期 但し、収穫60日前まで | 1回 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 砂壤土～埴土 | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ(関東・東山・東海を除く) | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

④直は用

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------|---|---------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| アックスMX1キ ロ粒剤 | ピリフタリド・メソ トリオン・メタゾス ルフロン粒剤 | セリ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ4 葉期 ただし、収穫 45日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| アットウZ1キ ロ粒剤 | テフルトリオン・ ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アットウ Z400FG | テフルトリオン・ ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン 粒剤 | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アットウZジャン ホ | テフルトリオン・ ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アットウZフロア ブル | テフルトリオン・ ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アッハレZ1キ ロ粒剤 | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン プロモフチ ^ト 粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる 散布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アッハレ Z400FG | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン プロモフチ ^ト 粒 剤 | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------------|--------|-------------|
| アッパレZジャン ホ | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン プロモフチド粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| アッパレZフロア ブル | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロン プロモフチド水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| アネシス1キロ粒 剤 | ピラゾスルフロン エチル・ブタク ロール・ベンゾ ビシクロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| イッテツ1キロ粒 剤 | イマゾスルフロ ン・カフェンスト ロール・ベンゾ ビシクロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| イッテツジャンホ | イマゾスルフロ ン・カフェンスト ロール・ベンゾ ビシクロン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | イッテツフロアブ ル | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| イネキング1キロ 粒剤 | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾビシクロン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|----------|------------------|----|---------|
| イネキングジャン ホ | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| イネキングフロア ブル | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ウイナー1キロ粒 剤51 | イプフェンカルバ ゾン・プロモプチ ド・ベンスルフロ ンメチル粒剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウイナーLジャン ホ | イプフェンカルバ ゾン・プロモプチ ド・ベンスルフロ ンメチル粒剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウイナーLフロア ブル | イプフェンカルバ ゾン・プロモプチ ド・ベンスルフロ ンメチル水和 剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウイニングラン1キ ロ粒剤 | イプフェンカルバ ゾン・プロモプチ ド・ベンスルフロ ンメチル粒剤 | セリ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウイニングラン ジャンホ | イプフェンカルバ ゾン・プロモプチ ド・ベンスルフロ ンメチル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------------|----------|--------------|--------|-------------|
| ウイニングランフロアブル | イブフェンカルバゾン・プロモブチド・ヘンズルフロメチル水和剤 | ウリカワ | 500mL/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ2.5葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | | 原液湛水散布のみとする。 | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| ウルティモZ1キロ粒剤 | シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロンの粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ3.5葉期ただし、収穫90日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ウルティモZジャンホ | シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロンの粒剤 | ウリカワ | 小包装(パック)10個(350g)/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ3.5葉期ただし、収穫90日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウルティモZフロアブル | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| エーワン1キロ粒剤 | オキサジクロメホン・テフルトリオンの粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 砂壤土～埴土 | 湛水散布のみとする | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| エーワンZジャンホ | オキサジクロメホン・テフルトリオンの粒剤 | ウリカワ | 小包装(パック)10個(300g)/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ2.5葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 砂壤土～埴土 | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| エーワンフロアブル | オキサジクロメホン・テフルトリオンの水和剤 | ウリカワ | 500mL/10a | 稲1葉期～ヒ ² エ3葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 砂壤土～埴土 | 原液湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------|---|--------|-------------|
| エンペラー1キロ 粒剤 | ピラクロニル・ピ リミナックメチ ル・フェキナト リオン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲出芽揃期～ヒ E3葉期但し、収穫 75日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| エンペラージャン ホ | ピラクロニル・ピ リミナックメチ ル・フェキナト リオン剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲出芽揃期～ヒ E3葉期但し、収穫 75日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| エンペラーフロア ブル | ピラクロニル・ピ リミナックメチ ル・フェキナト リオン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲出芽揃期～ヒ E3葉期但し、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | エンペラー豆つ ぶ250 | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カウンシルコンプ リート1キロ粒剤 | テフリルトリオン・ トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | ※薬害を生じ るおそれがある ので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツバイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | | | は種直後～ヒE 3.5葉期 ただし、収 穫90日前まで | | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--------|----------------|
| カウシコンプ リートジャンボ | テフリルトリオン・ トリアアフェモン粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | ※薬害を生じ るおそれがあ るので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| カウシコンプ リートフロアフル | テフリルトリオン・ トリアアフェモン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | は種直後～ヒエ 3.5葉期 ただし、収 穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 ※薬害を生じ るおそれがあ るので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | カチホシ1キロ粒 剤51 | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カチホシLジャン ボ | イフエンカルバ ゾン・テフリルト リオン・ヘンスルフ ロンメチル粒剤 | | アオイトロ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | カチホシLフロア フル | イフエンカルバ ゾン・テフリルト リオン・ヘンスルフ ロンメチル水和 剤 | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| カツトZ1キロ 粒剤 | テフリルトリオン・ プロピリスルフ ロン粒剤 | | | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|----------------------------|--------|-------------|
| ガツト Z200FG | テフルトリオン・ プロピルスルフロ ン粒剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 200g/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布、 のみとする。 | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ガツトZジャン ホ | テフルトリオン・ プロピルスルフロ ン粒剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (200g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ガツトZフロア ブル | テフルトリオン・ プロピルスルフロ ン水和剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| キマリテ1キロ粒 剤 | イプフェンカルバ ゾン・テフルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航 空機による 散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| キマリテジャンホ | イプフェンカルバ ゾン・テフルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| キマリテフロアブ ル | イプフェンカルバ ゾン・テフルトリ オン水和剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| クサハルカン1キ ロ粒剤 | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| クサハルカンジャン ホ | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| クサハルカンフロ アブル | ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ゲハート1キロ 粒剤 | ダイムロン・ピラ クロニル・ベンゾ ピシクロン・メタ ゾスルフロン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲2葉期～ヒエ4 葉期 但し、収穫60 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布とす る。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| コエモン1キロ粒 剤 | イプフェンカルバ ゾン・イマゾスル フロン・プロモプ チド粒剤 | アオミト・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| コエモンジャンホ | イプフェンカルバ ゾン・イマゾスル フロン・プロモプ チド粒剤 | アオミト・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| サラブレット KAI1キロ粒剤 | イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| サラブレット KAI400FG | イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル粒剤 | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--|--|
| サラブレットKAI ジャンボ | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ¹ エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| サラブレットKAI フロアブル | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ ¹ エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| サンテツ1キロ粒 剤 | ピリミスルファン ベンゾピシクロ ン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲出芽揃期～ヒ ¹ エ3葉期 但し、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | |
| サンバート粒 剤 | ピラゾレート粒 剤 | ホタルイ | 1.5kg/10 a(少量散 布) | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | 砂壤土 ～埴土 | | 普 | I | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | 3kg/10a | は種直後～ヒ ¹ エ1 葉期、ただし、収穫 90日前まで | 2回以 内 | 湛水散布 | | | 湛水散布のみ とする。 | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | 3kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | は種直後～ヒ ¹ エ1 葉期、ただし、収穫 90日前まで(近畿・ 中国・四国、九州 (壤土～埴土)で は、は種直後～ヒ ¹ エ1.5葉期、ただし、 収穫90日前まで) | 2回以 内 | 湛水散布又 は無人ヘリコプ ターによる散 布 | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ エ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | | 湛水散布のみ とする。 | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | |
| ジェイソウルジャ ンボ | シクロピリモレ ート・ピラゾレ ート・フェントラサ ミド粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (450g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ¹ エ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------------------|--|---------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| ジェイソウルフロ アフル | シクロピリモレー ト・ピラゾレート・ フェントラザミド 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジェイフレント ⁺ 1 キロ粒剤 | オキサジクロホ ン・テフリルトリオ ン・ピラクロニル 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ジェイフレント ⁺ 400FG | オキサジクロホ ン・テフリルトリオ ン・ピラクロニル 粒剤 | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジェイフレント ⁺ ジャンボ | オキサジクロホ ン・テフリルトリオ ン・ピラクロニル 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジェイフレント ⁺ フロ アフル | オキサジクロホ ン・テフリルトリオ ン・ピラクロニル 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジカマック500グ ラム粒剤 | ピラゾレート・ハ ンゾピシクロン・ メタゾスルフロン 粒剤 | ウリカワ | 500g/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | は種直後～ヒエ | | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| ジャンダルム MX1キロ粒剤 | ピリフタリド・ピリ ミスルファン・メト トリオン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジャンダルムMX ジャンボ | ピリフタリド・ピリ ミスルファン・メト トリオン剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ジャンダルムMX 豆つぶ250 | ピリフタリド・ピリ ミスルファン・メト トリオン剤 | ウリカワ | 250g/10a | 稲1葉期～ヒエ3.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| シュナイデン1キ ロ粒剤 | ピラゾレート・ベン ゾピシクロン・メ タゾスルフロ ン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| シュナイデンジャン ボ | ピラゾレート・ベン ゾピシクロン・メ タゾスルフロ ン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| シュナイデンフロ アフル | ピラゾレート・ベン ゾピシクロン・メ タゾスルフロ ン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| セータイガー1 キロ粒剤 | プロピリスルフロ ン・フロモフチ ド・ペントキサ ン粒剤 | アオミト・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|----------|---------------------------|----|---------|
| ゼータタイガー 300FG | プロピリスルフロ ン・プロモフチ ド・ペントキサゾ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 300g/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータタイガー ジャンホ | プロピリスルフロ ン・プロモフチ ド・ペントキサゾ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータタイガーフ ロアブル | プロピリスルフロ ン・プロモフチ ド・ペントキサゾ ン水和剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータハンマー1 キロ粒剤 | プロピリスルフロ ン・ペントキサゾ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータハンマー ジャンホ | プロピリスルフロ ン・ペントキサゾ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (200g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ゼータハンマーフ ロアブル | プロピリスルフロ ン・ペントキサゾ ン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------------------|--------|-------------|
| ダブルスター-SB 顆粒 | ピラズスルホン エチル・フェントラ ザミド・ベンゾ ビシクロン水和 剤 | ウリカワ | 80g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ツルギ250粒 剤 | イフフェンカルバ ゾン・イマゾスル フロン・ベンゾビ シクロン粒剤 | ウリカワ | 250g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ツルギジャンホ [*] | イフフェンカルバ ゾン・イマゾスル フロン・ベンゾビ シクロン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ツルギフロアブル | イフフェンカルバ ゾン・イマゾスル フロン・ベンゾビ シクロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ティオーレ1キロ 粒剤 | オキサジクロホ ン・テフリルトリ オン・メタゾスル フロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ティオーレジャン ホ [*] | オキサジクロホ ン・テフリルトリ オン・メタゾスル フロン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個(400g) /10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ティオーレフロア ブル | オキサジクロホ ン・テフリルトリ オン・メタゾスル フロン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壤 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------|
| デルタアタック1キ ロ粒剤 | イマズスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル・プロモフチ 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| デルタアタック ジャンボ | イマズスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル・プロモフチ 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | トップガンGT1 キロ粒剤51 | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| トップガンL250 グラム | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズフロ ンメチル・ペント キサゾン剤 | | アオイトロ・藻類によ る表層はく離 | 250g/10a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人ヘリ コプターによる 散布 | 砂壤土 ～埴土 | 湛水散布又は 湛水周縁散布 のみとする。 | 普 |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| トップガンジャン ボ | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズフロ ンメチル・ペント キサゾン剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^レ エ2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | 砂壤土 ～埴土 | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| トップガンシプロア ブル | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズフロ ンメチル・ペント キサゾン水和 剤 | アオイトロ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1.5葉期～ヒ ^レ エ3 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | 砂壤土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | アオイトロ・藻類によ る表層はく離 | | 稲1葉期～ヒ ^レ エ3 葉期 但し、収穫90 日前まで | | | 埴土～ 埴土 | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|------------------|--|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| トップガンR1キ ロ粒剤 | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズスフロ ンメチル・ペント キサゾン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| トップガンRジャ ンホ | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズスフロ ンメチル・ペント キサゾン剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のま ま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | トップガンRフロ アブル | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| トップガンR豆 つぶ250 | ピリミノバックメ チル・プロモフチ ド・ベンズスフロ ンメチル・ペント キサゾン剤 | ウリカワ | 250g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期但し、収穫90 日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ハッチリ1キロ粒 剤 | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ハッチリ400FG | イマゾスフロ ン・ピラクロニル ・プロモフチド粒 剤 | | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ハッチリLX1キロ 粒剤 | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモフチ ド粒剤 | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| ハッチリ LX400FG | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル・プロモフチ 粒剤 | ウリカワ | 400g/10a | 稲1葉期～ヒ [○] エ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハッチリLXシャ ンホ | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル・プロモフチ 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ [○] エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハッチリLXフロア ブル | イマゾスフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロニ ル・プロモフチ 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ [○] エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハッチリシャンホ | イマゾスフロ ン・ピラクロニル・ プロモフチ [○] 粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ [○] エ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハッチリフロアブ ル | イマゾスフロ ン・ピラクロニル・ プロモフチ [○] 水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲出芽始期～ヒ [○] エ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は水口 施用 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ヒエクリーン1キロ 粒剤 | ヒ [○] リミノハックメ ル粒剤 | ヒ [○] エ | 0.5～ 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | 普 | I |
| | | | | は種直後 | | 落水散布又 はごく浅く湛 水して散布 | | | | |
| | | | 1kg/10a | は種直後～稲出 芽前 | | | | | | |
| ヒ [○] クリーZ1キロ 粒剤 | ピラクロニル・プ ロピリスルフロ ン粒剤 | アオト [○] ロ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ [○] エ3 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|----------|---|--------|-------------|
| ピクトリ Z400FG | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロ ン 粒剤 | アオト・ロ・藻類によ る表層はく離 | 400g/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ピクトリ-Zジャン ホ | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロ ン 粒剤 | アオト・ロ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 水田に小包装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ピクトリ-Zフロ ア ブル | ピラクロニル・ブ ロピリスルフロ ン 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ピラクロニルキ ロ 粒剤 | ピラクロニル粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 | 普 | A |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 湛水直播のは種 直後～稲出芽前 ただし収穫60日 前まで | | 落水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 落水散布のみ とする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 湛水直播の稲出 芽始期～ヒエ1.5 葉期ただし収穫60 日前まで | | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|----------|---|--------|-------------|
| ピラクロフロア ブル | ピラクロニル水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 湛水直播のは種 直後～稲出芽前 ただし収穫60日前 まで | 1回 | 落水散布 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 | 普 | A |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | 湛水直播の稲出 芽始期～ヒエ1.5 葉期ただし収穫60 日前まで | 湛水散布 | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| フルセータ1キロ 粒剤 | プロピリスルフロ ン・ベンゾビシク ロン粒剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 湛水散布又は 無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| フルセータジャ ンホ | プロピリスルフロ ン・ベンゾビシク ロン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (ハック)10 個 (200g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 水田に小包 装(ハック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| フルセータフロ アブル | プロピリスルフロ ン・ベンゾビシク ロン水和剤 | アオミドロ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1.5葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 75日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| フレキープ1キロ 粒剤 | ピラゾキシフェ ン・ベンゾビシク ロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | 湛水直播の代か き後～は種7日前 またはは種直後 ～ヒエ1葉期但し 収穫90日前まで | | 湛水散布又は 無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------|------------------|--------|-------------|------|----|----------------|--|--|---|---|
| フレキーフロア ブル | ピラゾキシフェ ン・ベンゾピシク ロン水和剤 | ウリカワ | 300～ 500mL/1 0a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘルーガ1キロ 粒剤 | ピリミノバックメ チル・フェンキトリ オン粒剤 | アオトロ・藻類によ る表層はく離 | 0.5～ 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | 普 | I | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アオトロ・藻類によ る表層はく離 | | | | | | | | | は種直後 | 1回 | ごく浅く湛水 して散布 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アオトロ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | は種直後～レ ³ 葉期 但し、収穫 75日前まで | 湛水散布 | | | 普 | I | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘルーガジャン ホ | ピリミノバックメ チル・フェンキトリ オン剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (250g)/1 0a | 稲出芽揃期～レ ³ 葉期但し、収穫 75日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|----------|------------|--------|-------------|
| ベルーガフロアブル | ピリミノバクメチル・フェキトリオン水和剤 | ウリカワ | 500mL/10a | は種直後～ヒ ¹ ・E ³ 葉期但し、収穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ベルーガ豆つぶ250 | ピリミノバクメチル・フェキトリオン剤 | ウリカワ | 250g/10a | 稲出芽揃期～ヒ ¹ ・E ³ 葉期但し、収穫75日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ベンケイ1キロ粒剤 | ピリミスルファン・フェキサスルホン・ベンゾピシクロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ ・E ³ 葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ベンケイジャンボ | ピリミスルファン・フェキサスルホン・ベンゾピシクロン剤 | アオミロ・藻類による表層はく離 | 小包装(パック)10個(250g)/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ ・E ³ 葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ベンケイ豆つぶ250 | ピリミスルファン・フェキサスルホン・ベンゾピシクロン剤 | アオミロ・藻類による表層はく離 | 250g/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ ・E ³ 葉期 但し、収穫90日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ホデーガード1キロ粒剤 | テフリトリオン・フェントラサミド粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ ・E ^{2.5} 葉期 ただし、収穫90日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | | 湛水散布のみとする。 | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ホデーガードジャンボ | テフリトリオン・フェントラサミド粒剤 | ウリカワ | 小包装(パック)10個(400g)/10a | 稲1葉期～ヒ ¹ ・E ^{2.5} 葉期ただし、収穫90日前まで | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|---|--------|-------------|
| ホテ-ガードフ ロ1キロ粒剤 | テフリルトリオン・ トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | ※薬害を生じ るおそれがあ るので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | は種直後～ヒエ 3.5葉期 ただし、収 穫90日前まで | | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ホテ-ガードフ ロアブル | テフリルトリオン・ フェントラザミド 水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ホテ-ガードフ ロジャンホ | テフリルトリオン・ トリアファモン粒 剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | ※薬害を生じ るおそれがあ るので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ホテ-ガードフ ロフロアブル | テフリルトリオン・ トリアファモン水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | は種直後～ヒエ 3.5葉期 ただし、収 穫90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 ※薬害を生じ るおそれがあ るので、後作 物としてなす、 たまねぎおよ びさやえんど うは栽培しな いこと。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壤 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------|---|------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| マスラオ1キロ粒 剤 | イマゾスルフ ン・ヒリミノパッ ク メチル・フェキノ トリオン粒剤 | アオト ^ロ ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | は種直後～ヒ ^エ 3 葉期ただし、収穫 90日前まで | | 湛水散布、ご く浅く湛水し て散布又は 無人航空機 による散布 | 湛水散布、ご く浅く湛水し て散布、のみと する。 | | | |
| マスラオジャンホ ^ン | イマゾスルフ ン・ヒリミノパッ ク メチル・フェキノ トリオン粒剤 | アオト ^ロ ・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (200g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^エ 3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| マスラオフロア ^ブ ル | イマゾスルフ ン・ヒリミノパッ ク メチル・フェキノ トリオン水和剤 | アオト ^ロ ・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^エ 3 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機によ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ミスターホームラン Lフロア ^ブ ル | オキサジクロメ ン・クロメフロ ップ・ベンズルフ ンメチル水和 剤 | ウリカワ セリ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ ^エ 2.5 葉期 但し、収穫90 日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | 壤土～ 埴土 | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| メガセータ1キロ 粒剤 | ピラクロニル・フ ロピリスルフロ ン粒剤 | アオト ^ロ ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ^エ 3 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回 数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------|---------------------------|--------|-------------|
| マガゼータ 400FG | ピラクロニル・プロピリスルフロ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 400g/10a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布、湛 水周縁散布 又は無人航 空機による 散布 | | 湛水散布、湛 水周縁散布の みとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| マガゼータジャン ホ | ピラクロニル・プロピリスルフロ ン粒剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (400g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| マガゼータフロ アブル | ピラクロニル・プロピリスルフロ ン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ3 葉期ただし、収穫 60日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 ヘリコプターによ る滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ライジンパワー1 キロ粒剤 | インダノファン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン粒 剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ライジンパワー ジャンホ | インダノファン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン粒 剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-----------------|--|---------------------|---|---|---|------------------------------|------------|---|--------|-------------|
| ライジンパワー ロアブル | インダノファン・ヒ ラクロニル・ベン ゾピシクロン水 和剤 | アオトド・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 湛水直播の稲1葉 期～ヒエ2.5葉期 ただし、収穫90日 前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ラクダープロフ ロアブル | カフェンストール・タイムロン・ プロモブチド・ ペンシルフロメ チル水和水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布 | 砂壤土 ～埴土 | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| レプラス1キロ粒 剤 | ジメタメリン・ダ イムロン・テフリル トリオン・メタゾス ルフロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲2葉期～ヒエ4 葉期 但し、収穫60 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| 兆1キロ粒剤 | ピラクロニル粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時散 布機で施用 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 | 普 | A |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | 湛水直播のは種 直後～稲出芽前 ただし収穫60日 前まで | 落水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 落水散布のみ とする。 | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | 湛水直播の稲出 芽始期～ヒエ1.5 葉期ただし収穫60 日前まで | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 湛水散布のみ とする。 | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------|---|--------|---------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------|---|--------|-------------|
| 兆フロアブル | ピラクロニル水 和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 湛水直播のは種 直後～稲出芽前 ただし収穫60日前 まで | 1回 | 落水散布 | | ※薬害の恐れ があるため、 農薬ラベルの 「使用上の注 意」に従い、十 分注意して使 用する。 | 普 | A |
| | | ヒルムシロ | | | | 湛水散布 | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ウリカワ | | | | | | | | | | |
| ヒルムシロ | | | | | | | | | | |
| ホタルイ | | | | | | | | | | |
| マツハイ | | | | | | | | | | |
| 水田一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 天空1キロ粒 剤 | フェントラサミド・ ベンゾピシクロ ン・メタゾスルフロ ン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ² E3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| 天空ジャンボ | フェントラサミド・ ベンゾピシクロ ン・メタゾスルフロ ン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (300g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ² E3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 天空フロアブル | フェントラサミド・ ベンゾピシクロ ン・メタゾスルフロ ン水和剤 | ウリカワ | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒ ² E3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布又は無人 航空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 忍1キロ粒剤 | イマゾスルフロ ン・ピラクロニル・ ベンゾピシクロ ン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期～ヒ ² E2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| 忍ジャンボ | イマゾスルフロ ン・ピラクロニル・ ベンゾピシクロ ン粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)10 個 (200g)/1 0a | 稲1葉期～ヒ ² E2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壤 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------|------------------|--------|-------------|
| 忍フロアブル | イマズスフロ ン・ピラクロニル ベンゾピシクロ 水和剤 | アオト・藻類によ る表層はく離 | 500mL/1 0a | 稲1葉期～ヒエ2.5 葉期ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 原液湛水散 布、水口施用 又は無人航 空機による 滴下 | | 原液湛水散布 のみとする。 | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| アトカラSジャン ホMX | アゾムスフロ ン・ペノキススラ ム・メトリオン 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)20 個 (500g)/1 0a | 稲4葉期～ヒエ4 葉期 ただし、収穫 45日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| アトリ1キロ粒 剤 | ピリミスルファン 粒剤 | オモダカ | 1kg/10a | 稲5葉期～収穫45 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | クロクワイ | | | | | | | | |
| ウイードコア1キロ 粒剤 | フロルピラウキシ フェンペンシル ペノキススラム ベンゾピシクロ 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～ヒエ4 葉期 ただし、収穫 60日前まで | 2回以 内 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| カービー1キロ粒 剤 | シハロホップフチ ル・ベンゾピシ クロン・MCPB粒 剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲4葉期～ヒエ3 葉期 ただし、収穫 90日前まで | 1回 | 湛水散布 | | | 普 | I |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| グラスジンMナト リウム粒剤 | ペンタジン・ MCPAエチル 粒剤 | ウリカワ | 3～ 4kg/10a | 有効分けつ終 止期～幼穂形 成期前(但し収 穫60日前まで) | 1回 | 落水散布 | 壤土～ 埴土 | | 普 | I |
| | | セリ(北海道、東北、 近畿・中国・四国) | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道 を除く) | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 (イネ科を除く) | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ(北海道、東北、 近畿・中国・四国) | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ(北海道 を除く) | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 (イネ科を除く) | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|---------------------|---|---------------------|--|--|-------------|----------------------------------|------------|----------------|--------|-------------|
| クリンチャー1キロ 粒剤 | シハロホップブチ ル粒剤 | ノビエ | 1.5kg/10 a | は種後25日～ノビ エ4葉期 但し、収穫 30日前まで | 2回以 内 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | | 1kg/10a | は種後10日～ノビ エ3葉期 但し、収穫 30日前まで | | | | | | |
| クリンチャーEW | シハロホップブチ ル乳剤 | 一年生イネ科雑草 | 100mL/1 0a | は種後10日～ノビ エ5葉期 但し、収穫 30日前まで | 2回以 内 | 雑草茎葉散 布又は全面 散布 | | | 普 | I |
| クリンチャージャン ホ | シハロホップブチ ル粒剤 | ノビエ | 小包装 (パック)20 個 (1kg)/10a | は種後10日～ノビ エ3葉期 但し、収穫 30日前まで | 2回以 内 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | | 小包装 (パック)30 個 (1.5kg)/1 0a | は種後25日～ノビ エ4葉期 但し、収穫 30日前まで | | | | | | |
| クリンチャーハス ME液剤 | シハロホップブチ ル・ベンタゾン 液剤 | ウリカワ | 1000mL/ 10a | は種後10日～ノビ エ5葉期 但し、収穫 50日前まで | 2回以 内 | 乾田・落水状 態で雑草茎 葉散布又は 全面散布 | | | 普 | I |
| | | ヘオモタカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ザーベックス DX1キロ粒剤 | シハロホップブチ ル・シメリン・ベ ンプレート・ MCPB粒剤 | アオドロ・藻類によ る表層はく離 | 1kg/10a | 稲5葉期～ノビエ3.5 葉期まで 但し、収 穫60日前まで[は 種後の初期除草 剤による土壌処理 との体系で使用] | 1回 | 湛水散布 | 砂壤土 ～埴土 | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| サンパンチ1キロ 粒剤 | シハロホップブチ ル・ジメタマリ ン・ハロスルフロ ン・メチル・ベンゾ ビシクロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～ノビエ3.5 葉期まで 但し、収 穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| セカンドショットS ジャンホMX | アゾムスルフロ ン・ベノキスラム ・メトリオン 粒剤 | ウリカワ | 小包装 (パック)20 個 (500g)/1 0a | 稲4葉期～ノビエ4 葉期 ただし、収穫 45日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ニトウリュウ1キロ 粒剤 | ベノキスラム・ ベンゾビシクロン 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲4葉期～ノビエ4 葉期 但し、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒 性 | 魚 毒 性 |
|--------------------------|--|---------------------|---|---|-------------|----------------------------------|----------|----------------|--------|-------------|
| ニトリフェン ホ | ペノキスラム・ ベンゾピシクロ ン粒剤 | アオトド・藻類による 表層はく離 | 小包装 (パック)10 個 (500g)/1 0a | 稲4葉期～ヒエ4 葉期但し、収穫60 日前まで | 1回 | 水田に小包 装(パック)のま ま投げ入れ る。 | | | 普 | I |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ミニ液剤 | ビスピリバクテ トリウム塩液 剤 | 一年生雑草 | 100～ 200mL/1 0a | 乾田直播のは種 後10日～ヒエ5葉 期まで 但し、収穫 60日前まで | 1回 | 乾田・落水状 態で雑草茎 葉散布又は 全面散布 | | | 普 | I |
| | | イホクサ | 50～ 100mL/1 0a | 稲4葉期以降(入 水後)～イホクサの 茎長30cmまで 但 し、収穫60日前ま で | | 落水散布又 はごく浅く湛 水して散布 | | | | |
| | | クサネム | 稲4葉期以降(入 水後)～クサネムの 草丈40cmまで 但 し、収穫60日前ま で | | | | | | | |
| ハイカット1キロ 粒剤 | シハロホップフチ ル・ジメタトリ ン・ハロスルフロ ンメチル・ベンゾピ シクロン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～ヒエ3.5 葉期まで 但し、収 穫60日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする | 普 | I |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| ハイスコープ1キ ロ粒剤 | シクロピリモレ ート・テフリルト オン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～出芽後 50日ただし、収穫 45日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草(ヒエ を除く) | | | | | | | | |
| ハサگران液 剤(ナトリウム 塩) | ペンタザン液 剤 | ウリカワ | 500～ 700mL/1 0a | は種後35～50日 但し 収穫50日前 まで | 2回以 内 | 落水散布又 はごく浅く湛 水して散布 | | | 普 | I |
| | | オモダカ | | | | | | | | |
| | | クログワイ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草(イネ科 を除く) | | | | | | | | |
| ハサگران粒 剤(ナトリウム 塩) | ペンタザン粒 剤 | ウリカワ | 3kg/10a | 稲3葉期～入水50 日後 但し 収穫60 日前まで | 1回 | 落水散布又 はごく浅く湛 水して散布 | | | 普 | I |
| | | ヘラオモダカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツハイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 (イネ科を除く) | | | | | | | | |
| ヒエクリーン1キロ 粒剤 | ピリミノパクメチ ル粒剤 | ヒエ | 1kg/10a | 稲3葉期～ヒエ4 葉期 但し、収穫45 日前まで | 1回 | 湛水散布又 は無人ヘリコ プターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用雑草名 | 希釈倍数 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 適用土 壌 | 備考 | 毒性 | 魚 毒性 |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|----|---------|
| ヒエクリーンバサ グラン粒剤 | ピリミノバックメチ ル・ベンタゾン 粒剤 | ホタルイ | 3kg/10a | イネ3葉期～ノビエ4 葉期但し、収穫60 日前まで | 1回 | ごく浅く湛水 して散布 | | | 普 | I |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ヒエクリーン豆つ ぶ250 | ピリミノバックメチ ル剤 | ノビエ | 250g/10a | 稲3葉期～ノビエ3 葉期 但し、収穫45 日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| ルナクロス1キロ 粒剤 | シクロピロモレト ・テフリルトリ オン粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～出芽後 50日ただし、収穫 45日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人航空 機による散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草(ノビエ を除く) | | | | | | | | |
| ロイヤル乳剤 | フロピラウキシ フェンペンシル 乳剤 | ウリカワ | 200mL/1 0a | 稲3葉期～ノビエ5 葉期 但し、収穫 45日前まで | 2回以 内 | 乾田・落水状 態で雑草茎 葉散布又は 全面散布 | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ノビエ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生広葉雑草 | | | | | | | | |
| ワイドアタックD1 キロ粒剤 | タイムロン・ベノ キスラム粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲3葉期～ノビエ5 葉期 但し、収穫 60日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| セリ | | | | | | | | | | |
| ワイドアタックSC | ベノキスラム 水和剤 | ウリカワ | 100mL/1 0a | 稲3葉期～ノビエ5 葉期 但し、収穫30 日前まで | 2回以 内 | 雑草茎葉散 布又は全面 散布 | | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 一年生雑草 | | | | | | | | |
| | | ウリカワ | | | | | | | | |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ヘラオモタカ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| ミスガヤツリ | | | | | | | | | | |
| 一年生雑草 | | | | | | | | | | |
| ワイドショット1キ ロ粒剤 | テフリルトリオン ・ベノキスラム 粒剤 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲4葉期～ノビエ4 葉期 但し、収穫45 日前まで | 1回 | 湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布 | | 湛水散布のみ とする。 | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |
| ワイドパワー粒 剤 | ベノキスラム・ ベンタゾン粒 剤 | ウリカワ | 3kg/10a | 稲4葉期～ノビエ4 葉期 但し、収穫60 日前まで | 1回 | 落水散布又は ごく浅く湛 水して散布 | 砂壤土 ～埴土 | | 普 | I |
| | | セリ | | | | | | | | |
| | | ヒルムシロ | | | | | | | | |
| | | ホタルイ | | | | | | | | |
| | | マツバイ | | | | | | | | |
| | | ミスガヤツリ | | | | | | | | |
| | | 水田一年生雑草 | | | | | | | | |

⑤その他除草剤（耕起前、水田刈跡、水田畦畔等）

◆注意事項

一覧表に示す成分を含む剤について、下記の条件を満たせば登録していると思なします。但し、ダイロンゾルは農薬成分の見なし登録ではなく、薬剤に限ります。

- (1) 人畜毒性が普通物の農薬であること。
- (2) 水稻（移植、直播含む）や水田作物に登録があり、水田刈跡や水田畦畔、休耕田に登録されていること。
- (3) 液剤または水和剤であること。
- (4) 混合剤は、一覧表にある成分の組合せに限る。

表、その他除草剤で登録していると思なす農薬成分一覧表

| 農薬成分名 |
|--|
| グ ^レ リホサ ^ト イソフ ^ロ ロピ ^ル アルミン塩 |
| グ ^レ リホサ ^ト カリウム塩 |
| グ ^レ ルホネ ^ト |
| グ ^レ ルホネ ^ト P ^ナ トリウム塩 |
| MCPB |
| ピ ^ス ピ ^リ ハ ^ク ナトリウム塩 |
| ピ ^ラ フルフェ ^ニ エチ ^ル |

| 薬剤名 | 作物名 | 適用雑草名 | 毒性 | 魚毒性 |
|---------------------------------|----------|-------|----|-----|
| ダ ^イ ロンゾ ^ル | 水稻（水田畦畔） | 一年生雑草 | 普 | I |

注）農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。

注）普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称。