

## 3. 無人航空機 (無人ヘリコプター等)

## (1) 水稻 (殺菌・殺虫剤)

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
オリブライト250G	メトキシプロピコン剤	いもち病	250g/10 <sup>a</sup>	出穂10日前 まで ただ し、収穫45 日前まで	1回	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病						
		白葉枯病						
		穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						
		墨黒穂病 紋枯病						
カスミンパリタ <sup>®</sup> シ液剤	カスガマイシン・パ リタ <sup>®</sup> マイシン液剤	いもち病 紋枯病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
カスミン液剤	カスガマイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ダブルカットフロアブル	カスガマイシン・トリシ クラゾール水和剤	いもち病 穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
トライフロアブル	テブフロキン水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病 穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						
ノンプラスフロアブル	トリシクラゾール・フェリ ムゾン水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ハシタックゾール	メフロニル水和剤	紋枯病	6~8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
パリタ <sup>®</sup> シエア <sup>®</sup>	パリタ <sup>®</sup> マイシン液剤	紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	5回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ビームエイトゾール	トリシクラゾール水和 剤	いもち病	5~8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ビームゾール	トリシクラゾール水和 剤	いもち病	6~8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	劇	I
フジワン乳剤	イソプロチオラン乳剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病						
ブラシゾール	フェリムゾン・フサイ ド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		もみ枯細菌 病						
		内穎褐変病 穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ブラシフアブル	フェリムジン・フサイト水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		ごま葉枯病						
		もみ枯細菌病						
		稲こうじ病						
		褐条病						
		内穎褐変病						
		変色米(アルタリア菌)						
		変色米(エピコカム菌)						
		変色米(カーブリア菌)						
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)						
墨黒穂病								
モンカットフアブル	フルトラニル水和剤	紋枯病	8倍	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普	I
モンカットラブ サイト 20フアブル	フサライド・フルトラニル水和剤	いもち病	6~8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		紋枯病						
モンセレンフアブル	ヘンシクロン水和剤	紋枯病	8~10倍	収穫21日前まで	4回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
ラブ サイト ハリタ フアブル	ハリタマイシン・フサイト水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		紋枯病						
ラブ サイト フアブル	フサライド水和剤	いもち病	5~8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
イクシート フアブル	スルキサフロル水和剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメシ類						
		ツマグロヨコバイ						
エミリアフアブル	フルビリン水和剤	イネトオイムシ	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		ツマグロヨコバイ						
オーケストラフアブル	ヘンズヒリモキサン水和剤	ウカ類幼虫	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			8倍					
		ツマグロヨコバイ幼虫	16倍					
			8倍					
キラップ フアブル	エチフロール水和剤	イネトオイムシ	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類	8~16倍					
		カメシ類						
スターカメイト液剤10	ジノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメシ類						
		ツマグロヨコバイ	16倍					
スターカメイト液剤10	ジノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメシ類						
		ツマグロヨコバイ	16倍					
スミチオンMC	MEPマイクロカセル剤	カメシ類	3.2~4倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
スミチオン乳剤	MEP乳剤	カメシ類 ニカメイチュウ	8倍	収穫21日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ダントツフロアブル	クロチアニジン水和 剤	ウンカ類 カメシ類	24倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
トレボンエア-	エトフェン <sup>®</sup> ロックス乳 剤	イナゴ <sup>®</sup> 類 ウンカ類 カメシ類 コブノメイガ <sup>®</sup> ツマゲ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ フタヒコヤカ <sup>®</sup>	8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
トレボンスカイMC	エトフェン <sup>®</sup> ロックスマイ クロカブ <sup>®</sup> セル剤	カメシ類 ヒメトビ <sup>®</sup> ウンカ	16倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ダブルカットKフロアブル	エチフ <sup>®</sup> ロール・カスカ <sup>®</sup> マ イシン・トリシクラゾ <sup>®</sup> ール 水和剤	いもち病 カメシ類	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ダブルカットスタークルフロ アブル	ジノテフラン・カスカ <sup>®</sup> マ イシン・トリシクラゾ <sup>®</sup> ール 水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ダブルカットトレボンフロ アブル	エトフェン <sup>®</sup> ロックス・カ スカ <sup>®</sup> マイシン・トリシクラ ゾ <sup>®</sup> ール水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類 コブノメイガ <sup>®</sup> ツマゲ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ もみ枯細菌 病 内穎褐変病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
トライKフロアブル	エチフ <sup>®</sup> ロール・テフ <sup>®</sup> フロ キン水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類 稲こうじ病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ノンブラスダントツフロ アブル	クロチアニジン・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ール・フェリムゾ <sup>®</sup> ン 水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ビームエイトEXゾ <sup>®</sup> ル	スルホキサフロ <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ール水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ビームエイトエクシート <sup>®</sup> ゾ ル	スルホキサフロ <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ール水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ビームエイトスタークルゾ <sup>®</sup> ル	ジノテフラン・トリシクラ ゾ <sup>®</sup> ール水和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類 ツマゲ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ビームエイトトレボンゾ <sup>®</sup> ル	エトフェン <sup>®</sup> ロックス・ト リシクラゾ <sup>®</sup> ール水和 剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	5倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ブラシキラップ <sup>®</sup> フロアブ ル	エチフ <sup>®</sup> ロール・フェリム ゾ <sup>®</sup> ン・フサライト <sup>®</sup> 水 和剤	いもち病 ウンカ類 カメシ類	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ブラシダ <sup>®</sup> ントツプロ <sup>®</sup> アブル	クロチアジソン <sup>®</sup> ・フェリム ゾン <sup>®</sup> ・フサライド <sup>®</sup> 水 和剤	いもち病 ウカ類 カメシ類	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
プレート <sup>®</sup> スタークルゾ <sup>®</sup> ル	シノテフラン <sup>®</sup> ・フェリム ゾン <sup>®</sup> ・フサライド <sup>®</sup> 水 和剤	いもち病 ウカ類 カメシ類 ツマゲ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ もみ枯細菌 病 稲こうじ病 内穎褐変病 変色米(アルタ リア菌) 変色米(カー ブ <sup>®</sup> リア菌) 穂枯れ(こ ま葉枯病 菌)	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ラブ <sup>®</sup> サイト <sup>®</sup> K2プロ <sup>®</sup> アブル	エチプロール <sup>®</sup> ・フサライ ド <sup>®</sup> 水和剤	いもち病 カメシ類	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ラブ <sup>®</sup> サイト <sup>®</sup> スタークルプロ <sup>®</sup> アブル	シノテフラン <sup>®</sup> ・フサライ ド <sup>®</sup> 水和剤	いもち病 ウカ類 カメシ類	4倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ラブ <sup>®</sup> サイト <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ントツプロ <sup>®</sup> アブル	クロチアジソン <sup>®</sup> ・フサライ ド <sup>®</sup> 水和剤	いもち病 ウカ類 カメシ類	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I

## (2) 水稲 (除草剤)

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
アットウZ400FG	テフルトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスルフ ロン粒剤	移植 水稲	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	移植後3 日～ヒエ 4葉期 た だし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
アットウZフロアブル	テフルトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスルフ ロン水和剤	移植 水稲	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植後3 日～ヒエ 4葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			エゾノヤサカゲサ								
			一年生雑草 多年生広葉雑草								
アッパレZ400FG	ピラクロニル・ プロピリスルフ ロン・プロモブ チド粒剤	移植 水稲	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	移植後3 日～ヒエ 3葉期た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			エゾノヤサカゲサ								
			一年生雑草及び 多年生広葉雑草								
アトトリ豆つぶ 250	ピリスルファン 剤	移植 水稲	ヒエ	250g/ 10a	移植後14 日(稲5葉 期以降) ～ヒエ4 葉期 但 し、収穫 45日前ま で	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
イネキングフロアブル	ピラクロニル・ ピラゾレート・ ベンゾヒシク ロン水和剤	移植 水稲	ウリカ	500mL /10a	移植直後 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			オモタカ								
			クログワイ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモタカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ウィードコア 200SD粒剤	フロルピラウキン フェンハンジ ル・ヘノキスラ ム・ベンゾヒ シクロン粒剤	移植 水稲	ウリカ	200g/ 10a	移植後10 日～ヒエ 4葉期 た だし、収 穫60日前 まで	2回以 内	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ウイングランフロアブル	イプフェンカルバゾン・プロモブチド・ヘンズルフロンメチル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植直後～ヒエ2.5葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シズイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ウルティモZ350FG	シクロピリメト・ピラゾレート・プロピリスルフロンの粒剤	移植 水稻	エゾノヤスカグサ	350g/ 10a	移植後5日～ヒエ3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
エーワンフロアブル	オキサジクロホソ・テフリルトリオン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植後5日～ヒエ3葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は水口施用又は無人航空機による滴下	砂壤土～埴土	無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ(北海道)								
			セリ(北陸を除く)								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ(北海道)								
水田一年生雑草											
カイキZフロアブル	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロンの水和剤	移植 水稻	一年生雑草	500mL /10a	移植後3日～ヒエ3葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
カウシコンブリートフロアブル	テフリルトリオン・トリアフェモン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植後5日～ヒエ3.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			キシユウス・メノヒエ								
			クログワイ								
			コウキカダ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
カチホシフロアブル	イプフェンカルバゾン・テフリトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
カツトZ200FG	テフリトリオン・プロピリスルフロ粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	移植後3日～ヒエ3.5葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
カツトZフロアブル	テフリトリオン・プロピリスルフロ水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後3日～ヒエ3葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
カレット400FG	イマゾスルホン・テフリトリオン・ピラクロニル粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
キマリテフロアブル	イマゾフェンカル ハズン・テフリ ルトリオン水和 剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～レビエ3 葉期但 し、移植 後30日ま で	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターによる滴 下のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シズイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
キマリ400FG	イマゾスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	移植直後 ～レビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
キマリフロアブル	イマゾスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～レビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			クサバルカンフロア ブル								
オモダカ											
クログワイ											
ヒルムシロ											
ヘラオモダカ											
ホタルイ											
マツハイ											
ミスガヤツリ											
一年生雑草											



◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
クサメツツフロアブル	テニクロール・ベンズスルフロメチル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後5日～ヒエ2葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下	砂壤土	無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
			アオミドロ・藻類による表層はく離		移植直後～ヒエ2葉期 ただし、移植後30日まで			壤土～埴土			
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
グリンチャーEW	シハロホップ フチル乳剤	移植 水稻	ヒエ	100mL/10a	移植後20日～ヒエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I	
ケハートエアー粒剤	タイムロン・ヒラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロメチル粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後14日～ヒエ4葉期 但し、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	無人航空機による散布のみとする。	普	I	
サキカケ楽粒	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・フロルピラキシフェンベンジル粒剤	移植 水稻	ウリカ	250g/10a	移植直後～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			エゾノサヤカゲサ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
サスケ粒剤200	カフェンストール・シクロスフェムロン・タイムロン・ベンゾビシクロン粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/ 10a	移植後3日～ヒエ2葉期ただし、移植後30日まで	1回	水口施用、湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレットGO400FG	イマツスルフロシ・オキサジクロメホン・ヒラクロニル・プロモブチド粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレットGO700アブル	イマツスルフロシ・オキサジクロメホン・ヒラクロニル・プロモブチド水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/ 10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サラブレットKAI400FG	イマツスルフロシ・オキサジクロメホン・ヒラクロニル粒剤	移植 水稻	ウリカワ	400g/ 10a	移植直後～ヒエ2.5葉期但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
サブレット <sup>®</sup> KAI フロアブル	イマゾスルホ ン・オキサジ クロ メホン・ピラ クロ ニル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ルビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人ヘリコ プターに よる滴下		無人ヘリコ プターによる滴 下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ジェイソウルフロア ブル	シクロピリモレー ト・ピラゾレ ート・フェントラサ ミド水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ルビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			エゾノヤサカゲサ								
			オモダカ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ジェイフレント <sup>®</sup> 400FG	オキサジクロホ ン・テフリルトリ オン・ピラクロ ニル 粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/ 10a	移植後5 日～ルビエ 3葉期た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			ジャンタムMX 豆つぶ250								
多年生広葉雑草											
ゼータイク <sup>®</sup> - 300FG	プロピリスル フロン・プロモ フチド・ペン トキ ザン粒剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	300g/ 10a	移植後3 日～ルビエ 3葉期た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			エゾノヤサカゲサ								
			一年生雑草								
多年生広葉雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ゼータイカーフ アブル	プロピリスフ ロン・プロモ チド・ペンキ ザン水和 剤	移植 水稲	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	移植後3 日～ヒエ 3葉期た だし、移 植後30日 まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ワリカ								
			エゾノササカグサ								
			オモダカ								
			クロクワイ								
			コウキカラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
ゼータラス 200FG	フェンキトリ オン・プロ ピリス フロン粒 剤	移植 水稲	エゾノササカグサ	200g/ 10a	移植後3 日～ヒエ 4葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ツルギ250粒剤	イプフェンカ ルバゾン・イ マゾスルフ ロン・ペン ゾビシ ロン粒 剤	移植 水稲	一年生雑草	250g/ 10a	移植直後 ～ヒエ 2.5葉期 但し、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
ツルギフロアブル	イプフェンカ ルバゾン・イ マゾスルフ ロン・ペン ゾビシ ロン水 和剤	移植 水稲	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	500m L /10a	移植直後 ～ヒエ 2.5葉期 但し、移 植後30日 まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
ティオーレアー粒 剤	オキサジクロ モシ・テフ リトリ オン・メ タゾス ルフ ロン粒 剤	移植 水稲	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後1 日～ヒエ 3葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
ハッチリ400FG	イマゾスルフ ロン・ピ ラクロ ニ	移植 水稲	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	移植直後 ～ヒエ	1回	湛水散 布、湛水		無人航空機 による散布	普	I

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
	ル・プロモブチド <sup>®</sup> 粒剤		ウリカワ オモダカ クログワイ コウキカガラ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草		2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで		周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		のみとす る。		
バッチリ LX400FG	イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド <sup>®</sup> 粒剤	移植 水稻	一年生雑草  多年生広葉雑草	400g/ 10a	移植直後 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
バッチリLXフア ブル	イマゾスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド <sup>®</sup> 水和剤	移植 水稻	ウリカワ エゾノササカグサ オモダカ クログワイ コウキカガラ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草	500mL /10a	移植直後 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
ヒエクリン豆つ ぶ250	ピリミバク メチル剤	移植 水稻	ヒエ	250g/ 10a	移植後15 日～ヒエ 4葉期 但 し、収穫 45日前ま で	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人ヘリ コプター による散 布		無人ヘリコ プターによる散 布のみとす る。	普	I

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ビクトリーZ400FG	ピラクロニル・プロピリスフロロン粒剤	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植後5日～ヒエ3葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ビクトリーZ700ブル	ピラクロニル・プロピリスフロロン水和剤	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ワリワリ								
			エゾノヤサカグサ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキヤガラ								
			シズイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
フルパワーMX500グラムFG	ピラクロニル・フルセトスフロロン・メトリオン粒剤	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500g/10a	移植後5日～ヒエ3.5葉期但し収穫60日前まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			エゾノヤサカグサ								
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ペンケイ豆つぶ250	ピリミスルファン・フェノキサスロン・ベンゾビシクロン剤	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	250g/10a	移植後3日～ヒエ3葉期但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ホットコンビ200粒剤	テニクロール・ベンゾビシクロン粒剤	移植水稲	ヒルムシロ	200g/10a	移植直後～ヒエ2葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ホットコンビフアブル	テニクロール・ベンゾヒシクロン水和剤	移植水稲	ヒルムシロ	300mL/10a	植代後～移植前7日または移植直後～ルビエ1.5葉期ただし、移植後30日まで	2回以内	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		移植前に処理しない。無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
		ヒルムシロ	500mL/10a	移植直後～ルビエ2葉期ただし、移植後30日まで		無人航空機による滴下のみとする。					
		ハラオモダカ									
		ホタルイ									
		マツバイ									
		ミスガヤツリ									
		一年生雑草									
ホテーカートプロフロアブル	テフリトリオン・トリアファモン水和剤	移植水稲	ウリカリ	500mL/10a	移植後5日～ルビエ3.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			キシユウスメノヒエ								
			クロクワイ								
			コウキカラ								
			ゼリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
メグゼータ400FG	ピラクロニル・プロピリスフロニル粒剤	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植後5日～ルビエ3葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
レプラスエアー粒剤	ジメタメトリン・タイムロン・テフリトリオン・メタゾスフロニル粒剤	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後14日～ルビエ4葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ワザアリ薬粒	イブフェンカル バゾン・テフリ トリオン粒剤	移植 水稻	ワリカ	250g/ 10a	移植直後 ～レ <sup>3</sup> エ3 葉期 但し、移植 後30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又 は無人 航空機 による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
天空エア-粒剤	フェントラサミ ト・ベンゾ ビシクロン・メ タゾスルフロ ン粒剤	移植 水稻	一年生雑草	300g/ 10a	移植後1 日～レ <sup>3</sup> エ 3葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
天空フロアブル	フェントラサミ ト・ベンゾ ビシクロン・メ タゾスルフロ ン水和剤	移植 水稻	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	500mL /10a	移植直後 ～レ <sup>3</sup> エ3 葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
流星エア-粒剤	フェンキトリオ ン・ペントキサ ゾン・メタゾス ルフロ ン粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後3 日～レ <sup>3</sup> エ 3葉期 た だし、移 植後30日 まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
アットウZフロアブル	テフリトリオン・ ピラクロニル・ プロピリスル フロ ン水和剤	直播 水稻	ワリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～レ <sup>3</sup> エ3 葉期 た だし、収 穫90日 前 まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
アッパレZ400FG	ピラクロニル・ プロピリスル フロ ン・プロモブ フト粒剤	直播 水稻	ワリカ	400g/ 10a	稲1葉期 ～レ <sup>3</sup> エ3 葉期た だし、収 穫 90日 前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								



## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
アトリ豆つぶ 250	ピラミスルファン 剤	直播 水稻	オモダカ	250g/ 10a	稲5葉期 ～収穫45 日前まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			クログワイ								
イネキングフロアブ ル	ピラクロニル・ ピラゾレート・ ベンゾヒシク ロン水和剤	直播 水稻	ウリカリ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ウイニングランフロア ブル	イプフェンカル ハゾン・プロ モフチド・ヘ ンスルフロメチル 水和剤	直播 水稻	ウリカリ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒビエ 2.5葉期 但し、収 穫90日前 まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ウルティモZ350FG	シクロピリモレー ト・ピラゾレー ト・プロピリス ルフロン粒剤	直播 水稻	ウリカリ	350g/ 10a	稲1葉期 ～ヒビエ 3.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
エーワンフロアブル	オキサジクロホ ン・テフリルトリ オン水和剤	直播 水稻	ウリカリ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒビエ3 葉期 但 し、収穫 90日前 まで	1回	原液湛 水散布 又は水 口施用 又は無 人ヘリ コプタ ーによ る滴下	砂壤 土～ 埴土	無人ヘリコ プターによ る滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
カイキキZフロアブル	イプフェンカル ハゾン・テフリ ルトリオン・プロ ピリスルフロ ン水和剤	直播 水稻	ウリカリ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒビエ3 葉期 但 し、収穫 90日前 まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
カウシコンプロートフロアブル	テフリトリオン・トリアフェモン水和剤	直播水稲	ウリカワ	500mL/10a	は種直後～ヒエ3.5葉期ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
カチホシフロアブル	イプフェンカルバゾン・テフリトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期但し、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
ガツントZ200FG	テフリトリオン・プロピリスルフロンの粒剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	稲1葉期～ヒエ3葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ガツントZフロアブル	テフリトリオン・プロピリスルフロンの水和剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ヒエ3葉期ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
カラット400FG	イマゾスルホン・テフリトリオン・ピラクロニル粒剤	直播水稲	ウリカワ	400g/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
キラテフロアブル	イマゾフェンカル バゾン・テフリ ルトリオン水和 剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	稲1葉期 ～ノビエ3 葉期但 し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛 水散布 又は無 人ヘリコ プターに よる滴下		無人ヘリコ プターによる滴 下のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
キラ400FG	イマゾスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
キラフロアブル	イマゾスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
クサバルカンフロア ブル	ピラクロニル・ ピラゾレート・ ベンゾヒシク ロン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
クインチャーEW	シハロホップフ ル乳剤	直播 水稻	一年生イネ科雑草	100mL /10a	は種後10 日～ノビエ 4.5葉期 但し、収 穫30日前 まで	2回以 内	無人航 空機に よる散 布		普	I	
ゲバートエアー 粒剤	ダイムロン・ピ ラクロニル・ベン ゾヒシクロン・ メタゾスルフロ ン粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ノビエ4 葉期た だし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
サカケ薬粒	イマゾフェンカル バゾン・テフリ ルトリオン・フロ ピラウキシフェ ンベンジル粒 剤	直播 水稻	ウリカ	250g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 但し、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サスケ粒剤200	カフェンスト ール・シクロス ファミロン・タ イムロン・ベン ゾビシクロン 粒剤	直播 水稻	ウリカ	200g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ2 葉期た だし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレット GO400FG	イマゾスル フロン・オキサ ジクロメホン ・ヒラクロ ニル・フロモ ブチド粒剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サラブレット GO7 フロアブル	イマゾスル フロン・オキサ ジクロメホン ・ヒラクロ ニル・フロモ ブチド水和剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サラブレット KAI400FG	イマゾスル フロン・オキサ ジクロメホン ・ヒラクロ ニル粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 但し、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレット KAI フロアブル	イマゾスル フロン・オキサ ジクロメホン ・ヒラクロ ニル水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人ヘリ コプタ ーによ る滴下		無人ヘリコ プターによ る滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ジェイソウルフロアブル	シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド水和剤	直播 水稻	ウリカキ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ジェイフレント400FG	オキサジクロモソン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	直播 水稻	ウリカキ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ジャンタムMX豆つぶ250	ピリフタリト・ピリミスルファン・メソトリオン剤	直播 水稻	ウリカキ	250g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 3.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ゼータタイガー300FG	プロピリスフロロン・フロモフチド・ヘントキサゾン粒剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	300g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ3 葉期た だし、 収穫 90日 前ま で	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカキ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ゼータタイガーフロアブル	プロピリスフロロン・フロモフチド・ヘントキサゾン水和剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ3 葉期た だし、 収穫 90日 前ま で	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカキ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
セータプラス 200FG	フェンキトリオン・プロピルスルホン粒剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	稲1葉期～ヒエ3.5葉期 ただし、収穫75日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカキ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ツルギ250粒剤	イプフェンカルバゾン・イマゾスルホン・ベンゾヒシロン粒剤	直播水稲	ウリカキ	250g/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ツルギフロアブル	イプフェンカルバゾン・イマゾスルホン・ベンゾヒシロン水和剤	直播水稲	ウリカキ	500mg/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
テイオーレアー粒剤	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルホン粒剤	直播水稲	ウリカキ	400g/10a	稲1葉期～ヒエ3葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ハッチリ400FG	イマゾスルホン・ヒラクロニル・プロモブチド粒剤	直播水稲	ウリカキ	400g/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ハッチリLX400FG	イマゾスルホン・オキサジクロメホン・ヒラクロニル・プロモブチド粒剤	直播水稲	ウリカキ	400g/10a	稲1葉期～ヒエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ハッチリLXフロアブル	イマゾスルホ ン・オキサジ クロ メホン・ピラ クロ ニル・プロモ フ チド水和剤	直播 水稻	ワリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ヒエクリン豆つぶ250	ピリミドハ ック メチル剤	直播 水稻	ヒエ	250g/ 10a	稲3葉期 ～ヒエ3 葉期 但 し、収穫 45日前ま で	1回	湛水散 布又は 無人ヘリ コプター による散 布		無人ヘリコ プターによ る散 布のみとす る。	普	I
ビクトリー Z400FG	ピラクロニ ル・プロピ リスル フ ロン粒剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ3 葉期た だし、収 穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散 布のみとす る。	普	I
			ワリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ビクトリーZフロアブル	ピラクロニ ル・プロピ リスル フ ロン水和剤	直播 水稻	ワリカ	500mL /10a	稲1葉期 ～ヒエ3 葉期 た だし、収 穫60日 前まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人ヘリコ プターに よる滴下		無人ヘリコ プターによ る滴 下のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
フルパワーMX500 グラムFG	ピラクロニ ル・フル セトスル フ ロン・メ トリオン粒 剤	直播 水稻	ワリカ	500g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ 3.5葉期 但し収 穫60日 前まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散 布のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツバイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ベンケイ豆つぶ 250	ピリミドス ル ファン・フェ ノキサス ル ホン・ベン ゾ ビシクロ ン剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	250g/ 10a	稲1葉期 ～ヒエ3 葉期 但 し、収 穫90日 前まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散 布のみとす る。	普	I
			ワリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ホテールガード プロフロアブル	テフリトリオン・ トリアフェモン水 和剤	直播 水稻	ウリカワ	500mL/ 10a	は種直後 ～ルビエ 3.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
メカゼータ 400FG	ビラクロニル・ プロピリスフ ロン粒剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類に よる表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期 ～ルビエ3 葉期た だし、収 穫60日 前ま で	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
レプラスエアー粒 剤	ジメタメリン・ タイムロン・テ フリトリオン・メ タゾスルフロン粒 剤	直播 水稻	ウリカワ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ルビエ4 葉期 た だし、収 穫60日 前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
天空エアー粒剤	フェントラサミ ト・ベンゾ ビシクロン・メ タゾスルフロン粒 剤	直播 水稻	ウリカワ	300g/ 10a	稲1葉期 ～ルビエ3 葉期 た だし、収 穫90日 前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
天空フロアブル	フェントラサミ ト・ベンゾ ビシクロン・メ タゾスルフロン水 和剤	直播 水稻	ウリカワ	500mL/ 10a	稲1葉期 ～ルビエ3 葉期 た だし、収 穫90日 前 まで	1回	原液湛 水散布 又は無 人航空 機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
流星エアー粒剤	フェンキトリオ ン・ペントキサ ゾン・メタゾス ルフロン粒剤	直播 水稻	ウリカワ	400g/ 10a	稲1葉期 ～ルビエ3 葉期 た だし、収 穫90日 前 まで	1回	湛水散 布又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											



(3) 麦類・大豆 (殺菌・殺虫剤)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚毒性
シルバキアフロアブル	テコナゾール水和剤	大麦	うどんこ病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		小麦			収穫7日前まで				
		大麦	赤かび病		収穫14日前まで				
		小麦	赤さび病		収穫7日前まで				
フルト乳剤25	フロピコナゾール乳剤	大麦	赤かび病	8倍	収穫21日前まで	1回	無人航空機による散布	普	I
		小麦			収穫7日前まで	3回以内			
トップジンMZ	チオファネートメチル水和剤	小麦	赤かび病	8倍	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は2回以内)	無人航空機による散布	普	I
		麦類(小麦を除く)			収穫21日前まで				
ミラビスフロアブル	ヒジメフルメトフェン水和剤	大麦	赤かび病	8~16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	II
		小麦			収穫7日前まで				
ワークアップフロアブル	メコナゾール水和剤	麦類	うどんこ病	10~16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			黄斑病						
			赤かび病	10~24倍					
			赤さび病	10~16倍					
スミチオン乳剤	MEP乳剤	小麦	アブラムシ類	8倍	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布	普	I
		大麦							
アミスター-20フロアブル	アゾキシストロピン水和剤	だいず	紫斑病	16~24倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
トップジンMZ	チオファネートメチル水和剤	だいず	紫斑病	5倍	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普	I
トライフロアブル	テコナゾール水和剤	だいず	紫斑病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
				8倍					
ファンタジスタフロアブル	ヒリペンカルブ水和剤	だいず	菌核病	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			紫斑病						
ブランドム乳剤25	ジフェノコナゾール乳剤	だいず	紫斑病	16~24倍	開花後~ 収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
スターケルメイト液剤10	ジメテラン液剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
			タスシヤタマハ						
			ワタシヒメハムシ						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和5年12月15日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
スタール液剤10	ジノテフラン液剤	だいでず	カメムシ類	8倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
			ダ <sup>ス</sup> イ <sup>ス</sup> サ <sup>ヤ</sup> マ <sup>ハ</sup> エ						
			フ <sup>タ</sup> ス <sup>ジ</sup> ヒ <sup>メ</sup> ハ <sup>ム</sup> シ						
スミチオントレホ <sup>ン</sup> 乳剤	イトフェン <sup>ブ</sup> ロク <sup>ス</sup> ス・MEP乳剤	だいでず	カメムシ類	8倍	収穫21日 前まで	2回以内	無人ヘリコ <sup>プ</sup> ター による散布	普	I
スミチオン乳剤	MEP乳剤	だいでず	ウコンメ <sup>イ</sup> ガ	8倍	収穫21日 前まで	4回以内	無人航空機 による散布	普	I
			カメムシ類						
			シロイ <sup>チ</sup> モ <sup>シ</sup> マ <sup>タ</sup> ラ メ <sup>イ</sup> ガ						
			ダ <sup>ス</sup> イ <sup>ス</sup> サ <sup>ヤ</sup> マ <sup>ハ</sup> エ						
			ダ <sup>ス</sup> イ <sup>ス</sup> サ <sup>ヤ</sup> ム <sup>シ</sup> ガ						
			マ <sup>メ</sup> シ <sup>ン</sup> ク <sup>イ</sup> ガ						
トレホ <sup>ン</sup> エア <sup>ー</sup>	イトフェン <sup>ブ</sup> ロク <sup>ス</sup> 乳剤	だいでず	カメムシ類	8倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
			ツメクサ <sup>ガ</sup>						
			ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ						
			マ <sup>メ</sup> シ <sup>ン</sup> ク <sup>イ</sup> ガ						
トレホ <sup>ン</sup> スカイ <sup>MC</sup>	イトフェン <sup>ブ</sup> ロク <sup>ス</sup> マイクロカ <sup>プ</sup> セル剤	だいでず	カメムシ類	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人ヘリコ <sup>プ</sup> ター による散布	普	I
			ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ						
			マ <sup>メ</sup> シ <sup>ン</sup> ク <sup>イ</sup> ガ	16倍					
				8倍					
ノーモルト乳剤	テルベ <sup>ン</sup> ズ <sup>ン</sup> ロン 乳剤	だいでず	ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
プレオフロア <sup>ブル</sup>	ピ <sup>リ</sup> タ <sup>リ</sup> ル水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ	8~16倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
プレハ <sup>ソ</sup> ソ <sup>フ</sup> ロア <sup>ブル</sup> 5	クラントラ <sup>リ</sup> フ ロール水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ウコンメ <sup>イ</sup> ガ	16~32倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
			オ <sup>オ</sup> タ <sup>ハ</sup> コ <sup>ガ</sup>						
			ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ						
			マ <sup>メ</sup> シ <sup>ン</sup> ク <sup>イ</sup> ガ						
ヘ <sup>ガ</sup> サスフロア <sup>ブル</sup>	フルベ <sup>ン</sup> ジ <sup>ア</sup> ミ <sup>ド</sup> 水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ	16~32倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人ヘリコ <sup>プ</sup> ター による散布	普	I
マトリックフロア <sup>ブル</sup>	ク <sup>マ</sup> フェ <sup>ノ</sup> ジ <sup>ド</sup> 水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ	8~16倍	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布	普	I
ロム <sup>タ</sup> ンエア <sup>ー</sup>	テ <sup>フ</sup> フェ <sup>ノ</sup> ジ <sup>ド</sup> 水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ	16倍	収穫14日 前まで	3回以内	無人ヘリコ <sup>プ</sup> ター による散布	普	I
アミスタートレホ <sup>ン</sup> SE	イトフェン <sup>ブ</sup> ロク <sup>ス</sup> ス・ア <sup>ソ</sup> キ <sup>ス</sup> ト <sup>ロ</sup> ピ <sup>ン</sup> 水 <sup>和</sup> 剤	だいでず	ア <sup>ブ</sup> ラムシ類	8倍	収穫21日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I
			カメムシ類						
			ハスモンヨ <sup>ト</sup> ウ						
			マ <sup>メ</sup> シ <sup>ン</sup> ク <sup>イ</sup> ガ						
			紫斑病						