

## 過去にあった質問と回答

Q：①薬剤を全部吐き出してしまった時の効果はどうか。

②薬剤の飲み心地や味はどうか。

③丸剤を砕いて牛乳で服用することは可能か

A：① 全部吐き出してしまった場合は、再度服用する必要がある。

② ゼリー剤は、イチゴ味で甘い。丸剤は味付けされておらず、少し苦みがある。丸剤は砕いて、水やお湯で服用しても良い。

③ どんな状態であってもまずは服用いただきたい。牛乳は胃への負担を軽くできる。

Q：安定ヨウ素剤の服用指示が出たとき、施設職員は具体的に何をすればいいのか

A：一時集合場所であれば、市役所職員とともに安定ヨウ素剤の配布や住民の点呼などを手伝っていただきたい。

Q：40 歳以上には効果がないというが、高齢者施設に備蓄が必要なのか。

A：住民の中には、40 歳以上でも要求される者もあり、その者も含めて全員に配布できるよう備蓄することが国から示されている。

Q：服用指示は施設まで届くのか。

A：服用指示が出るときは、避難指示と併せて判断される。避難指示は、いつ、どこへ避難するべきか個別の調整を施設とすることから、そのとき服用の指示も受けることになる。

Q：警戒事態で子どもを保護者のもとに帰せなかったとき、施設敷地緊急事態などの間に子どもを帰せないのか。

A：屋内退避準備指示が出ている間は、外出禁止ではない。災害の状況によるので、都度、市と相談されたい。